

E. et CC. Se nourrit de mulots, d'insectes, de perdrix et autres oiseaux ; s'approche souvent des basses-cours pour surprendre des poulets et des rats. Niche dans les sapins, pruches etc. ; pond 4 œufs d'un blanc rougeâtre ou jaunâtre, tachetés de brun rougeâtre.

## 2 Gen. AUTOUR. *Astur*, Lacép.

Bec court, courbé dès la base ; mandibule supérieure lobée, mais non dentée. Ailes courtes ; queue et jambes longues ; lère rémige plus courte que ses voisines. Taille allongée et assez grêle ; à vol très rapide. Notre faune en compte 3 espèces.

1. **L'Autour à tête noire.** *Astur atricapillus*, Bonap. *Falco*, Wils. *F. regalis*, Tadm. *Dædalion pictum*, Lesson.—Vulg. *L'autour commun* ; Angl. *Goshawk*.—Longueur 22-24 pouces ; ailes 14-15 ; queue 10½-11. Bec noir, d'un bleu léger à la base ; cire jaune-verdâtre ; sourcils bleu-jaunâtre ; iris rouge orange ; pieds jaunes. Dessus de la tête et du cou avec une bande au dessous des yeux, d'un noir plus ou moins cendré, le reste des parties supérieures d'un cendré bleuâtre ou ardoisé, chaque plume liserée de noir ou portant une ligne longitudinale de cette couleur au milieu ; bande blanche au dessus des yeux. Parties inférieures tachetées de blanc ou d'un brun cendré, avec de nombreuses lignes irrégulières de la même couleur. Pennes caudales brunes, en dessous presque blanches, avec 4 bandes obscures de brun-cendré, et terminées de blanc. (Mus. Univ. Lav.).

E. et C. Fait particulièrement la chasse aux tourtes et autres petits oiseaux. Niche dans les conifères, pins, pruches etc ; pond 4 œufs blancs teints de bleu verdâtre.

## Sous-Genre ACCIPITRE, *Accipiter*, Brisson.

Les espèces qui se rangent dans ce sous-genre ne se distinguent des autours proprement dits (*Astur*) que par une taille plus grêle et plus petite.

2. **L'Autour de Cooper.** *Accipiter Cooperii*, Bonap. *Falco Cooperii* Bonap. *F. Stanleii*, Aud.—Angl. *Cooper's Hawk*.—Longueur 15-16 pouces ; ailes 9-10 ; queue 8-9. Bec d'un bleu de corne, iris rouge orange. Tête, noir mêlé de bleu sur l'occiput, le reste des parties supérieures brun-cendré foncé avec une ligne longitudinale noire sur chaque plume ; un collier roux obscur en arrière du cou ; gorge et couvertures inférieures de la queue blanches ; toutes les parties inférieures barrées transversalement de roux clair ou de blanc ; rémiges brun-cendré, avec bandes plus foncées et des taches blanches irrégulières sur le bord interne ; queue brun cendré, terminée de blanc, avec 4 larges bandes brun foncé.