

le pouvoir coagulant, et qu'enfin la coagulation occupe toujours au début le fond du récipient ;

2^o Que les coagula se forment exclusivement au contact de la face interne où les rayons électriques ont la plus grande intensité, et non au centre du sac anévrysmal ou aux points de surface se moulant et se stratifiant sur cette même surface interne. On n'a donc pas à craindre, avec ce procédé, de voir ces coagula transportés par le courant sanguin sous forme d'embolies, comme de nombreux faits cliniques ont démontré qu'il pouvait survenir dans d'autres cas.

Les observations cliniques, appuyées par les expériences des laboratoire, démontrent donc la possibilité d'obtenir un caillot susceptible d'organisation ; le malade qui nous a été présenté, et dont la guérison remonte à trois ans, en est une preuve manifeste.

Maintenant, ces caillots ont-ils les mêmes qualités physiques et, par conséquent, les mêmes propriétés que les caillots ordinaires ? Il est encore difficile de répondre. Mais, ce que nous savons bien, c'est que l'expérience a démontré, comme les recherches de Broca et de Regnault en témoignent, que les courants électriques agissent surtout en coagulant l'albumine du sang, tout en provoquant également la coagulation de la fibrine tandis que les caillots formés spontanément ne retiennent que fort peu d'albumine dans leur réseau fibrineux.

Pour conclure, nous dirons :

1^o Que les applications externes de courant galvanique peuvent déterminer la formation de caillots stratifiés dans les sacs anévrysmaux ;

2^o Qu'on peut, par cette méthode, obtenir des améliorations équivalentes à des guérisons ;

3^o Qu'on observe en tous cas la diminution du volume de la tumeur et l'amendement des symptômes, principalement des douleurs névralgiques ;

4^o Que cette méthode ne présente ni inconvénient ni danger puisqu'elle peut être appliquée par le malade lui-même :

5^o Qu'on peut la combiner avec une autre méthode, l'électropuncture par exemple, dans les cas graves.—*Le Nouveau Journal Médical.*

Traitement de la syphilis infantile.—L'action du mercure est réellement puissante dans la syphilis infantile. Voici le traitement que je conseille de prescrire, en pareil cas, et de faire rigoureusement exécuter.

Tous les matins et tous les soirs, vous ferez faire à l'enfant