

ble fonctionnel dépasse toujours et souvent de beaucoup la lésion organique. Le psychisme et le physiologisme (physique ou matériel), s'entremêlant d'une façon si intime dans tous nos actes, la rééducation efficace devra toujours être à la fois physique et psychique à des degrés divers".

SUPPLEMENT

DIARRHÉE INFECTIEUSE

PAR WILLIAM EDWARD FITCH, M. D.,

Professeur de chirurgie, Université de Fordham, Ecole de Médecine, New-York City.

Nous traiterons sur ce sujet de l'infection du petit et du gros intestin comme une seule maladie.

Nous procéderons de suite au traitement sans étiologie ni symptôme

Il faut d'abord évacuer l'intestin, et le calomel semble être le médicament de choix.

Chez un enfant de deux ans nous donnons trois grains de calomel avec sucre de lait, divisé en trois poudres et administré d'heure en heure, suivi d'une dose d'huile de ricin qui produit des selles abondantes ; ensuite un bon lavage d'intestin d'une partie de Glyco-Thymoline, une partie d'eau de chaux et deux parties d'eau distillée.

Une pinte de cette solution est employée en lavage au moyen du tube intestinal retenu en place jusqu'à évacuation.

La Glyco-Thymoline est aussi très utile chez les enfants en-dessous de deux ans, à la dose de 30 ou 40 gouttes dans une cuillerée à soupe d'eau toutes les quatre heures, comme antiseptique et astringent intestinal sans affecter les fonctions digestives.

C'est aussi un médicament efficace dans toute inflammation catarrhale de l'intestin, il empêche l'absorption des toxines, diminue les sécrétions, améliore la condition.

Dans ces cas, les lésions principales affectent le colon particulièrement, et l'absorption est très rapide, et de là j'ai conclu qu'un lavage antiseptique alcalin serait logique et effectif ; car non seulement il favorise l'évacuation, mais aussi nettoie les muqueuses et favorise la guérison.

La diète est aussi un point important qu'il faut savoir diriger.