

cours d'une grossesse, M. Garipuy eut recours à la méthode de Copeman (dilatation prudente du col et décollement du pôle inférieur du l'œuf) aidée de la suggestion ; on mit en effet sous les yeux de la malade une cuvette contenant quelques débris placentaires, qui lui firent croire que l'avortement était effectué. A partir de ce moment, les vomissements cessèrent et la grossesse continua à évoluer normalement (*Soc. d'obstétrique de Paris, 17 janvier 1907*).

Traitemenit des dartres du visage, (Brocq).—1° Avant de se coucher appliquer la pommade :

Borate de soude	o gr. 50
Teinture de benjoin.....	XV gouttes.
Oxyde de zinc.....	2 grammes.
Cérat sans eau ou vaseline pure.....	18 grammes.

2° Si cette pommade est insuffisante, la remplacer par la suivante ;

Tanin.....	2 grammes.
Calomel.....	1 gramme.
Glycérolé d'amidon à la glycérine neutre.....	30 grammes.

(Cette préparation est instable et doit être renouvelée tous les huit jours.)

3° Au réveil enlever la pommade avec des boulettes de ouate et ensuite faire le lavage nasal. Après quoi on lotionnera deux à trois fois dans la journée avec :

Boraté de soude.....	5 à 10 grammes
Glycérine neutre.....	50 grammes.
Eau de roses.....	500 grammes.

(Nouv. Remèdes.)
