

la malade et même lui faire perdre connaissance. Durant les quelques jours qui suivirent, du sang fut passé par les selles.

Cette personne avait toujours, jusqu'alors, joui d'une assez bonne santé. L'histoire de sa famille ne nous fournit aucun renseignement.

Lorsqu'on se trouve en présence d'un cas d'hématémèse, la première pensée qui doit se présenter à l'esprit, c'est qu'on a affaire à un ulcère de l'estomac ou peut-être à un cancer. Cependant, règle générale, l'ulcération de l'estomac est précédée des symptômes caractéristiques de cette affection, savoir : la douleur, l'indigestion et les vomissements. D'après le rapport de la malade, rien de tel ne s'est présenté dans son cas.

Dans le cancer, l'hématémèse se montre habituellement à la période de ramollissement de la masse cancéreuse, et alors le sang, au lieu de s'échapper abondamment, est rejeté en petites quantités à la fois (*marc de café, poussière noirâtre*). Alors aussi, d'autres symptômes particuliers au cancer accompagnent le vomissement de sang. Cependant, Messieurs, l'hémorragie peut être précocce, ainsi que le prétend Trousseau, et précéder de quelques mois, voir même de quelques années le développement du cancer. Mais laissez-moi vous dire que la chose est fort rare, du moins en ce pays.

L'hématémèse reconnaît encore d'autres causes, *v. g.* gêne de la circulation porte au niveau du foie, par suite de maladie de cet organe ou par affection organique du cœur, les anévrysmes siégeant à l'estomac, ou dans son voisinage immédiat et s'ouvrant dans cet organe, l'ingestion de quelque substance irritante ou corrosive, etc., mais dans ces cas les signes propres à ces derniers accidents seront là pour éclairer le diagnostic. L'hémorragie peut enfin être supplémentaire, se montrer au lieu et place de la menstruation, mais ici la malade a toujours été menstruée régulièrement. Le diagnostic reste donc à faire entre l'ulcère et le cancer de l'estomac. Cette personne n'a présenté aucun des symptômes de l'ulcère gastrique ; elle n'a pas, dans le passé, souffert d'indigestion ni même de tout autre trouble gastrique se rapportant à l'ulcération. Quant au cancer, rien n'indique, pour le moment, l'existence de cette affection chez notre malade, à moins que nous n'ayons affaire à une de ces hématémèses précoces et rares dont nous parlions tout à l'heure.

Si nous prenions en considération le début de cette hémorragie, nous inclinierions à croire que l'accident doit être rangé au nombre de ces hématémèses dites idiopathiques, reconnues par Flint, et qui reconnaîtraient ici, pour point de départ, les troubles gastriques résultant de l'indigestion.

Mais devons-nous accepter sans hésitation le rapport de la malade qui dit avoir *vomi* du sang ? Ne pourrait-elle pas l'avoir *craché* ? Cette question se pose ici avec autant plus d'à-propos que