

Une endométrite septique et parfois, assez fréquemment, une pseudo-endométrite coexiste avec le fibrôme. La pseudo-endométrite n'est qu'une congestion marquée d'une muqueuse épaissie et à capillaires friables. Cette stase sanguine est due uniquement au voisinage irritant du néoplasme et non à la présence de microbes. Au cours du traitement électrique elle peut devenir virulente par des fautes d'antisepsie.

L'endométrite septique elle-même peut s'aggraver d'une manière inquiétante et prendre un caractère hémorrhagique ou purulent qu'elle n'avait pas auparavant. Les observations où même les hémorrhagies ont augmenté ne manquent pas à l'appui de ce que j'avance.

L'aggravation des lésions annexielles est tellement réelle et admise, que la présence de celles-ci est la seule contre-indication précise au traitement des fibro-myômes par le galvanisme.

*Hémorrhagies.* — Elles sont possibles à la suite des séances, surtout quand le pôle négatif a été intra-utérin. Les femmes à fibrômes douloureux, accompagnés de troubles menstruels, y sont plus prédisposées. On sait que l'électrode négative est très congestionnante, et c'est ce qui faisait dire à Danion, autrefois partisan, adversaire maintenant de la méthode Apostoli, "qu'il croyait utile de faire observer qu'on détermine parfois avec le pôle négatif des hémorrhagies des plus inquiétantes."

Apostoli lui-même dit qu'au début du traitement le pôle négatif peut augmenter les hémorrhagies existantes ou les produire si elles n'existent pas. Un peu de persévérance dans le traitement supprimerait bientôt ces pertes de sang. (1)

C'est une arme à double tranchant (Apostoli) dont le mode d'action est assez obscur et requerrait de plus amples détails pour satisfaire un esprit tant soit peu inquisiteur.

Certaines hémorrhagies peuvent avoir pour point de départ une application trop prolongée de l'électrode intra-utérine dont l'action devient à la fin cautérisante et qui parfois va jusqu'à ulcérer la muqueuse friable dans toute son épaisseur. Ces cautérisations peuvent comprendre des vaisseaux d'un volume assez important ou ouvrir dans la cavité utérine des portions kystiques ou vasculaires d'un néoplasme ramolli ou dégénéré.

Nous avons été à même d'examiner un utérus enlevé par hystérectomie abdominale qui présentait à la face supé-

---

(1) Thèse Carlet, 1884.