crochets, qui n'existe pas chez le tœnia inerme. Les autres vers rubannés sont rares en France.

La fréquence du tœnia est en rapport avec la consommation de viande de bœuf crue ou peu cuite; d'où l'indication de ne jamais manger que de la viande suffisamment cuite, pour que tous les agents nuisibles qu'elle contient soient détruits.

Le diagnostic du tœnia ne se fait guère que lorsque le malade remarque dans ses selles la présence de petits rectangles blancgrisâtres, qui sont des anneaux détachés du tœnia. Quand il s'agit du tœnia inerme, les anneaux s'éliminent souvent d'une façon spontanée, par petites quantités à la fois.

RÈCLES GÉNÉRALES DU TRAITEMENT DES TŒNIAS.—1° Il ne faut pas ordonner un traitement antihelmintique avant d'avoir constaté la présence du ver dans les selles, et, quand le traitement a échoué une fois, il ne faut le prescrire à nouveau que quelques mois plus tard, quand le ver s'est suffisamment développé. Se méfier des malades qui se figurent avoir un tœnia et qui n'en ont jamais eu;

2º Ne pas soumettre le malade à une diète rigoureuse pendant les jours qui précèdent la médication. Quand l'intestin est vide, les médicaments sont absorbés plus facilement, et il pourrait y avoir intoxication. Donner la veille du lait, des œufs et peu de viande;

3º Il faut donner successivement le médicament tœnicide et un purgatif; le premier engourdit le tœnia, le second l'expulse;

4° Le malade doit aller à la selle sur un vase rempli d'eau tiède; le ver, soutenu par l'eau, ne se brise pas, et la tête peut être expulsée plus facilement; il est aussi plus facile ainsi d'examiner le ver et de voir si la tête ne manque pas.

Médicaments tanicides.—Ils sont nombreux, mais leur efficacité n'est pas identique; les plus actifs sont la fougère mâle, l'écorce de racine de grenadier et le kousso. La mousse de Corse et les graines de citrouille sont à rejeter.

Fougère mâle.—On peut donner la poudre de fougère mâle en nature, 6 grammes dans 150 grammes d'eau, que l'on prend le matin à jeun. Une heure après on prend un paquet de calomel ou de rhubarbe et scammonée. Mais il est plus commode de prendre l'extrait éthéré de fougère mâle, que l'on prend en capsules associé au calomel.