

16 *Lyde ocracées*. *Lyda crata*, Say.

♀—Long. .36 pce. D'un jaune verdâtre, brillante; tête plus large que le thorax. Yeux petits et largement séparés. Antennes de 28 articles, noirâtres, la moitié basilaire du premier article pâle, ce premier article 3 fois aussi long que le second, le 3e pas si long que le 1er, à peine plus long que le 4e. Une tache sur le vertex renfermant les ocelles et 2 lignes dans les sutures de la base des antennes à l'occiput, noir. Tête transparente avec 3 ou 4 croissants bruns, s'étendant des orbites extérieurs au derrière de la tête. Labre large, noirâtre; une ligne noirâtre transversale sur le cou, une tache sur le collier de chaque côté près des scapulaires, unie par les sutures au lobe antérieur, une tache plus grande de chaque côté de l'écusson avec d'autres taches sur le métathorax, noir. Quatre taches brunes sur le mésothorax, 2 sur le lobe antérieur, et une sur chacun des lobes latéraux. Abdomen noirâtre aux côtés, plus pâle au milieu. Pattes jaunâtres; sommet des cuisses, les jambes et les tarses, brun. Ailes hyalines, grandes, les nervures brunes; le stigma pâle; la nervure séparant les 2 radiales coïncidant avec la seconde nervure transverse; 3e cellule brachiale à nervures transverses incomplètes.—Ottawa (Harrington).

Après le genre *Lyda*, p. 228, ajoutez le suivant.

Gen. LOPHYRE, *Lophyrus*, Latr.

Tête transverse, grosse dans les ♂, petite dans les ♀, chaperon petit, à bords ondulés; labre petit, arrondi. Antennes de 17-23 articles, dentées en scie dans les ♀, bipectinées dans les ♂, l'article terminal simple. Ailes avec une cellule marginale et quatre cubitales, la nervule divisant les 2 premières incomplète, la 2e et la 3e chacune avec une nervure récurrente; ailes inférieures avec 2 cellules disoïdales. Abdomen large et déprimé

Larves non-poilues, sociétaires, sur le pin et le sapin.

Trois espèces rencontrées.