

Chez les syphilitiques, au cours de la période secondaire, il se produit des épanchements dont les malades sont guéris assez rapidement par la médication. Les pleurésies tardives des syphilitiques ne seraient que des manifestations tuberculeuses atténuées (Sergent).

La pleurésie qui suit les maladies infectieuses est en général minime et de courte durée.

L'épanchement qui accompagne la pneumonie demeure souvent insignifiant.

Dans la grippe, la pleurésie sero-fibrineuse se termine communément en 2 ou 3 semaines. Reste maintenant le grand chapitre des pleurésies tuberculeuses qui groupe environ la moitié des malades. Cela dure plus longtemps et expose à la tuberculose ultérieure.

(Extraits: Journal des Praticiens No. 28-1922).

ALBUM MEDICAL

Le professeur Gaston Michel, terminait sa leçon d'ouverture de clinique chirurgicale à la Faculté de médecine de Nancy, 8 novembre 1922, par les conseils suivants:

Comme le dit Fiolle, la période d'apprentissage est critique pour tout chirurgien. L'avenir dépend en grande partie du bonheur des débuts.

Dites-vous bien que l'apprentissage de la chirurgie est long, il dure tout e la vie.

Il n'est pas une technique qui ne puisse être améliorée de quelque çon.

L'effort constant est nécessaire à qui ne veut déchoir.

Vous avez deux écueils à éviter: l'optimisme excessif et le scepticisme.

L'optimisme excessif entraîne aux actions déréglées.

Le chirurgien qui croit ne jamais se tromper, qui ne doute jamais de lui peut devenir dangereux.

Tous nous avons fait la réflexion de Montaigne: "Que sais-je?"

Le plus grand faible des hommes c'est l'amour qu'ils ont pour la vie.

La plus grande victoire, c'est celle qui impose une trêve, à la douleur et à la mort.

Le médecin, le chirurgien, doivent toujours laisser derrière eux l'apaisement et l'espoir.

Lisez la magnifique monographie du bon et du grand chirurgien qu'est le professeur J.-Louis Faure, intitulée: "L'âme du chirurgien", vous