

A l'aide d'une poire en caoutchouc, on leur fera donner de temps en temps un des lavements suivants :

℞	Glycerine neutre à 30° .....	25 grammes
	Décocté de guimauve .....	100 —
M. s. a.		
℞	Miel du gâtinais .....	25 —
	Décocté de graine de lin .....	100 —
M. s. a.		
℞	Huile de ricin .....	10 —
	Gomme arabique pulvérisée .....	5 —
	Décocté d'orge.....	100 —

Une ou deux fois par semaine, faire prendre le matin, au lever, dans une tasse de lait, 10 à 15 grammes de manne, ou une cuillerée à café de magnésie calcinée. Conseiller également les suppositoires suivants

℞	Beurre de cacao.....	25 gr.
	En 10 suppositoires.....	
	Un suppositoire de temps en temps.	

**CONVULSIONS.** — Les convulsions peuvent être le résultat de troubles de la dentition, de troubles digestifs, cérébraux ; elles peuvent encore apparaître au début d'une fièvre éruptive. A l'aide d'une poire en caoutchouc, faire donner à l'enfant un lavement ainsi composé :

℞	Huile de ricin.....	20 grammes
	Poudre de gomme arabique .....	10 —
	Glycerine neutre .....	20 —
	Décocté de guimauve.....	80 —
M. s. a.		

Dès que celui-ci sera évacué, faire administrer le suivant :

℞	Analgésine.....	20 vingt centigr.
	Eau distillée.....	40 gr.

Appliquer deux sangsues derrière chaque oreille. Donner un grand bain tiède, ou faire appliquer des compresses d'eau vinaigrée sur les jambes et les cuisses. Dès qu'il sera possible, faire prendre la potion suivante par cuillerée à dessert tous les quart d'heure :

	Bromure de potassium (K. Br.).....	1 gramme
	Sirop de chloral.....	10 —
	Hydrolat de fleurs d'orange.....	80 —
M. s. a.		

Si l'on soupçonne la syphilis prescrire de faire matin et soir des frictions, sous les aisselles ou dans les régions inguinales, avec la pommade suivante.

℞	Onguent napolitain.....	10 grammes
	Vaseline blanche.....	10 —

M. s. a.

Et faire donner deux fois par jour le lavement suivant :

℞	Iodure de potassium.....	0,40 centigr.
	Lait.....	40 grammes

M. s. a.

Si l'on s'agit de troubles de la dentition, à l'aide d'un bistouri, faire une légère incision pour faciliter la sortie de la dent, puis 2 ou 3 fois par jour, badigeonner la gencive avec un pinceau trempé dans le mélange suivant :

℞	Teinture de crocus sativus.....	V gouttes
	Sirop diacode.....	40 grammes

M. s. a.

Au cas de vers intestinaux : faire sucer suivant l'âge de l'enfant de 2 à 6 tablettes de santonine contenant par tablette, un centigramme. La santonine doit être administrée après les repas et non les matins à jeun. Ne pas s'inquiéter de la coloration que peuvent prendre les urines sous l'influence de ce médicament.

Après cette médication faire prendre tous les 2 jours à jeun une cuillerée à café de magnésie calcinée delayée dans une tasse de lait.