

maladie, de boissons additionnées d'une certaine quantité de vin, le quart ou le cinquième, comme tisano ; si les enfants ne veulent pas la tisano de limonade qui est la plus généralement employée, on peut leur donner simplement du vin coupé avec de l'eau, ou bien encore du vin de Malaga au quinquina. En même temps on administre quotidiennement une potion ainsi composée :

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Julep gommeux.....         | ℥ii ss |
| Sirop de limon .....       | ℥v     |
| Eau-de-vie, 20 à.....      | ℥vj    |
| Extrait de quinquina ..... | ℥ss    |

Enfin, à titre de tonique, M. Archambault donne très souvent le sulfate de quinine à la dose de 20 à 30 centigrammes pour les enfants de sept à huit ans.

A côté de cette médication s'adressant à l'état général du malade, il y a des symptômes particuliers qu'il faut surveiller. Au début, par exemple, si l'embarras gastrique paraît très prononcé, on donne un vomitif avec du sirop et de la poudre d'Ipéca. On peut le remplacer par la potion suivante :

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Décoction de polygala..... | ℥iiij  |
| Sirop d'Ipéca .....        | ℥j     |
| Poudre d'Ipéca.....        | grs xv |

On donne le quart de cette potion toutes les dix minutes. Un léger purgatif est aussi souvent nécessaire, d'autant plus que la constipation est fréquente dans la fièvre typhoïde des enfants, et on donne alors des eaux minérales naturelles, ou du citrate de magnésie dans une petite quantité de véhicule.

S'il se produit des douleurs vives dans la fosse iliaque, ce qui est assez fréquent chez les enfants, on doit s'abstenir de toute application de sangsues et faire simplement des embrocations calmantes, appliquer un cataplasme de flanelle imbibé d'une solution narcotique, ou même faire une injection sous-cutanée avec un quart de centigramme de morphine.

Les bains tièdes donnés tous les jours pendant la période aiguë constituent encore un moyen sédatif très favorable et utile à beaucoup de points de vue.

Enfin si la diarrhée est très intense, il est nécessaire de la modérer, et on peut le faire très rapidement avec la potion suivante :

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Julep gommeux.....        | ℥iv            |
| Bismuth.....              | ℥j             |
| Laudanum de Sydenham..... | 2 à 4 gouttes. |

Tels sont les principaux moyens à employer dans les formes moyennes de la maladie. Dans la forme grave, les mêmes procédés sont applicables au début. Mais on observe quelque-