assez rapprochées à la base, leur premier article gros, allongé, cylindrique.

Insectes de taille moyenne, à couleurs pâles, qu'on trouve d'ordinaire sur les fleurs. La femelle dépose ses œufs dans les tiges tendres des Ronces, Framboisiers etc., qu'elle perce de sa tarière. Comme tous ceux de cette famille, les mâles strident vers le soir et durant la nuit.

Ce genre se distingue surtout de ses voisins par ses cuisses postérieures grêles, à peine renflées.

Une seule espèce rencontrée.

Æcanthe blanc. *Æcanthus niveus*, De Gêér.—♀ Longueur du vertex à l'extrémité de la tarière .60 pce; long. de la tarière .32 pce. D'un jaune pâle uniforme, les yeux, une petite tache sur le vertex, l'extrémité des antennes, avec les tarsi et la tarière, brun. Elytres légèrement transparentes, dépassant un peu l'abdomen. Ailes transparentes, un peu plus longues que les élytres. Abdomen brunâtre à l'extrémité, ses appendices terminaux jaune-pâle, aussi longs que la tarière. Cuisses postérieures à peine épaissies à la base, leurs jambes brunes à l'extrémité.

♂ Blanc sans aucune tache. Elytres plus larges à l'extrémité, les organes de stridulation couvrant toute la face dorsale.

La première capture de cet insecte en cette Province fut faite à West-Farnham en Juin dernier; nous n'avions jusque là que de simples soupçons de sa présence sur notre territoire. Le 14 Août dernier, étant à faire une chasse entomologique à St. Hyacinthe avec M. l'abbé Burque, ce M. fut assez heureux pour en prendre deux autres individus; c'était deux femelles. Elles furent capturées en fauchant à l'aveugle dans des Verges-d'or et autres plantes. On pourra peut-être rencontrer cet insecte plus au Nord.

Gen. NEMOBIUS, Serv. Vol. VIII, p. 60.

Page 61, au lieu, de :

3. Némobie exigue. *Nemobius exiguus*, Say, lisez;

Némobie du Nord. *Nemobius (Anaxipha) septentrionalis*, Scudder. (*)

(*) Les Orthoptérologistes nous ont tout récemment gratifiés d'une foule de noms de genres nouveaux, attribués à des espèces récemment découvertes ou à des divisions d'anciens genres. C'est ainsi qu'avec eux cette Némobie porte actuellement le nom d'*Anaxipha septentrionalis*. N'étant pas suffisamment renseigné sur les caractères propres de ces nouveaux genres, nous nous contenterons de les énoncer entre parenthèses.