

d'Août. Il niche dans les cheminées où il pond 4 à 5 œufs blancs, quelquefois tachetés de brun au gros bout. Le Martinet est un oiseau qui mérite protection, parce qu'il se nourrit exclusivement d'insectes.

Fam. DES CAPRIMULGIDES. *Caprimulgidae.*

Bec très court, triangulaire, plus ou moins pourvu de soies à la base; narines séparées, voisines de la commissure; doigts antérieurs unis par une membrane à la base; l'intérieur à 3 articles, les autres à 4, tous pourvus d'écaillés; tarses en partie emplumés supérieurement; primaires 10, secondaires 11 ou 12; plumage lâche, presque hérissé.

Cette famille, dans notre faune, se subdivise en deux genres ne renfermant chacun qu'une seule espèce.

Gen. ENGOULEVENT. *Antrostomus*, Gould.

Bec très petit, à narines tubuleuses, portant à la base des soies longues, raides, et quelquefois pectinées; ailes longues, primaires émarginées intérieurement, la 2e la plus longue; queue arrondie; plumage doux et lâche.

Engoulevent criard. *Antrostomus vociferus*, Bonap. *Caprimulgus voc.* Wilson.—Vulg. *Pomme-pourrie*; Angl. *Whip-poor-will*. Longueur 10 pouces; ailes 6½. Soies de la base du bec simples, noires; parties supérieures d'un fauve grisâtre, varié de taches noires; une raie longitudinale noire de chaque côté de la tête; gorge variée de roux, de blanc et de brun; moitié terminale des pennes caudales, excepté les 4 du milieu, d'un blanc sale.

La femelle sans blanc à la queue.

E. et R. Le nom vulgaire de cet Engoulevent lui vient de son cri que l'anglais et le français représentent assez exactement, bien qu'il s'articule différemment dans les deux langues. Beaucoup plus commun dans Ontario, on ne le voit que rarement dans Québec. Nous l'avons rencontré à Nicolet, à Bécancour et à Stanfold. C'est un oiseau à habitudes totalement nocturnes; il ne se montre jamais le jour. Il niche sur la terre et pond deux œufs à fond d'un blanc de crème, superbement tachetés de lignes, de points, de zigzags de brun plus ou moins foncé. C'est un insectivore émérite.