

*36. *FICUS tinctoria.*

F. foliis oblique ovatis obtusis, receptaculis turbinatis basi calyculatis. Forst. prod. n. 405.

Färber-Feige. W.

Habitat in Societatis insulis. ♀.

*37. *FICUS septica.*

F. foliis obliquis oblongo-ovatis acuminatis, pedunculis geminis apice calyculatis, receptaculis verrucosis.

Forst. prod. n. 407.

Aetzende Feige. W.

Habitat in insula Tanna. ♀.

*38. *FICUS falcata.*

F. foliis oblongis falcatis glabris, caule filiformi radicante. Thunb. diff. de flou. n. 8.

Sichelblättrige Feige. W.

Habita in India orientali. ♀.

Caules filiformes decumbentes radicanes flexuosi brunnei. Rami filiformes simplices cauli similes. Folia obliqua inserta latere altero angustiore, oblonga falcata obtusa, tenuissima nervosa integra glabra, supra viridia, subtus pallida unguicularia. Petiolus brevissimus. Thunb. l. c.

+++ *Foliis indivisis integerrimis basi angustatis.*

*39. *FICUS clethraefolia. W.*

F. foliis obovato-oblongis integerrimis basi angustatis obtusiusculis subtus pubescentibus, receptaculis obovatis geminatis pedunculatis. W.

Clethrablättrige Feige. W.

Habitat ad Caracas. ♀. (v. f. j. fl.) Bredemeyer.

Arbor 30 - pedalis cortice cinereo glabro. Folia petiolata tri - seu quinquepollicaria obovato-oblonga apice obtusa vel obsolete acuminata, basi angustata, margine integerrima, supra glabra subtus tenui pube obducta. Petioli subpollicares. Receptacula pisi magnitudine obovata carnea albo-punctata geminata brevissima pedunculata. Valde similis *F. velutinae* sed folia basi non rotundata, nec subtus pube mollissima ferruginea obducta. W.

*40. *F.*

F. fo
tis

pe
Gels

Hab

Ar

Folia

gust

gine

Rece

subr

di -

*41. *F.*

F. fo

tu

A

Knö

Hab

R

seu

gust

gine

tida

bofa

42. *F.*

F. f

ap

g

le

F. f

v

Ficu

F. a

2

Itty

Var

Hoc

Bem

Ha

Lan