

aigu ; il s'écoule, par les orifices des glandes un liquide d'abord clair, puis muqueux, vitreux, filant, dû à la suractivité des fonctions génitales ; plus tard il peut s'y former du pus. Cette complication donne lieu à des douleurs très-vives vers les parties inférieures de la vulve ; il se forme peu à peu sur les parties latérales une tumeur dure, qui se ramollit rapidement, l'œdème circonvoisin gagne les petites lèvres, puis les grandes lèvres qui sont rouges et tuméfiées ; le phlegmon peut même s'étendre jusque-là, et par ailleurs, jusqu'au périnée, comme cela se fait chez l'homme, après l'inflammation des glandes bulbo uréthrales. Le phlegmon des glandes vulvo vaginales guérit assez facilement, mais il est sujet à récidiver, quelquefois à cinq ou six reprises dans le cours de la maladie, et même il peut rester fistuleux, ce qui est une cause nouvelle de contagion.

La blennorrhagie se traitera chez la femme par les mêmes procédés que chez l'homme ; mais chez elle les balsamiques ne s'éliminant que par les urines, ne pourraient avoir aucune influence sur la muqueuse vaginale, à moins de mettre les urines chargées de ces principes en contact avec la muqueuse, on arrive à ce résultat en les employant en injections qui produisent de bons effets.—*Le Praticien.*



Traitements de l'hémorrhagie "Post Partum".—

Voici d'après un long travail publié dans la *Revue des maladies des femmes*, le résumé du traitement rationnel préconisé par le Dr ENGELMANN :

A.—*Traitement préventif après l'établissement du travail.*—

1. Sérieuse attention à chaque détail et stricte application des règles de l'obstétrique dans chaque cas de travail.

2. Administration d'une dose complète d'ergot lorsque la tête franchit l'orifice vaginal.

3. Si l'hémorrhagie menace, suivre le fond de l'utérus avec la main fortement appliquée.

4. Extraire le placenta par la méthode de Crédé, et étreindre fortement avec la main le fond de l'utérus.

B.—*Traitement de l'hémorrhagie déclarée.*—1. Manipulation externe, pression et friction avec la main froide au avec de la glace.

2. Ergot.—Le mieux en injections sous-cutanées, une ou deux bonnes doses, tandis qu'on augmente les manipulations.

3. Introduction de la main dans le vagin, et, si les contractions ne se produisent pas, aller jusque dans l'utérus ; extraire