

“ 2. Ne pas vacciner en temps d'épidémie d'érysipèle à moins d'y être absolument contraint et forcé par les circonstances.

“ 3. Se servir autant que possible de vaccin animal, absolument frais et récemment préparé.

“ 4. Rejeter, à moins d'absolue nécessité, la vaccination de bras à bras. Dans ce cas, choisir un enfant vaccinifère absolument sain et âgé d'au moins 3 mois ; ne jamais prendre de vaccin après le septième jour, ni sur des pustules inflammées et écorchées, mais choisir des pustules bien formées. Lavez la pustule avant de l'ouvrir avec une solution d'acide borique au centième.

“ 5. N'employer jamais de vaccin mêlé de sang.

“ 6. Si l'on se sert d'une lancette, il faut la désinfecter rigoureusement immédiatement avant de s'en servir. Pour cela, se servir d'une lampe à alcool et exposer quelques instants l'instrument à la flamme ou la tremper dans l'eau bouillante.

“ 7. Eviter en vaccinant l'effusion du sang qui empêche la pénétration du liquide vaccinal dans l'économie.

“ 8. Vacciner autant que faire se peut sur le bras, à la partie supérieure, et y faire trois inoculations.

“ 9. Lavez le bras de l'enfant à vacciner.

“ 10. Recouvrir le bras au niveau des pointes vaccinés, en vue d'y maintenir une température uniforme, d'empêcher les grattements qu'y appellent les démangeaisons, dont ils ne tardent pas à être le siège.

DR J.-I. DESROCHES.

JEUX DES ENFANTS — GYMNASTIQUE

1^e Les différentes manières d'obtenir un parfait développement de l'enfance ont été, et sont encore, l'objet de l'étude de tous, et non seulement les parents font de leur mieux pour donner à leurs enfants l'instruction et l'éducation, mais aussi les pédagogistes, pour atteindre ce but, suggèrent de nouveaux systèmes et les mettent à l'essai.

Ces systèmes ont tous le même point de départ : l'observation attentive et persévérande de l'enfance, la recherche des moyens propres à satisfaire les besoins de la nature. Parmi ces besoins, le premier, le plus général, le plus spontané est, pour le jeune enfant