

sans être considérée comme infirme, l'autre jusqu'à 6 ans $\frac{1}{2}$ sans presque attirer l'attention. Chez ces deux enfants, le symptôme caractéristique, la boiterie, était réduit à si peu de chose que, même en possession de l'interrogatoire, de l'examen d'inspection, l'hésitation était encore permise.

Les radiographies, d'ailleurs, sont identiques. Dans les deux cas, on a affaire à des variétés sus-cotyloïdiennes appuyées. Dans les deux cas, le toit du cotyle est érodé et la tête vient prendre contact au niveau correspondant à l'arrêt de ce toit.

Les fémurs se montrent dans une position à peu près normale.

Les cols ne présentent, ni dans leur volume, ni dans leur profil, ni dans leur densité, rien de bien particulier. Celui de la luxation simple Z. K. . . présente un léger degré de rotation interne. Les têtes sont aplaties. L'épiphyse céphalique, qui devrait, à cet âge, égaler la longueur du col, est réduite à un simple coussinet, plus développé, d'ailleurs, en haut qu'en bas, la partie inférieure semblant supporter une plus grande pression. Les épines de ce col semblent être un peu hypertrophiées.

Ces deux cas, bien semblables, posent donc une fois de plus le problème de l'évolution si différente des luxations congénitales et de la variabilité même de leur aspect clinique.

Il est certain que, dans la luxation congénitale, tous les degrés peuvent s'observer au moment de la naissance, et les autopsies de MM. Kirmisson et Potocki et celles de MM. Lepage et Grosse (*Revue d'Orthopédie*, 1901), qui montrèrent, sur des squelettes d'enfants nouveau-nés, des vices de conformation portant sur toutes les parties constituant de l'article, sont essentiellement différentes de celles de Caubet (*Arch. Méd. Toulouse*, Mars 1906), où les déformations se bornaient à l'absence du bourrelet fibro-cartilagineux (sur une longueur de 1 centimètre répondant au passage de la tête) et d'une partie du revêtement hyalin cartilagineux.

Tous les intermédiaires sont possibles. Lackwood rapporte un cas où le cotyle, peu élevé, contenait cependant la tête, ce qui n'était qu'une ébauche de luxation.