

Alcalinité.....	5.00	“
2 onces toutes les 2 heures.....		

Les troubles de la digestion sont généralement causés par les graisses et les matières protéïdes, et ces dernières surtout sont difficiles à digérer.

Il ne faut pas s'attendre à une augmentation de poids avant deux ou trois semaines. A ce moment le tube intestinal commence à s'améliorer et à mesure que ce résultat est obtenu on peut augmenter les proportions de matières nutritives dans le lait — et la quantité donnée chaque fois sera augmentée jusqu'à ce qu'on ait obtenu le succès.

Il est bon de commencer par augmenter la quantité et de n'élever la proportion des éléments qu'avec la plus grande prudence. Car il est remarquable que la plus légère augmentation dans la proportion de l'élément en faute, amène des symptômes graves d'indigestion.

Chez les enfants nés avant terme, la valeur toute spéciale de l'alimentation par le lait modifié a été prouvée à maintes reprises.

Le pouvoir digestif est si faible, chez ces enfants, que le lait maternel lui-même souvent ne leur convient pas.

Il faut avoir présent à l'esprit que chez ces enfants nés avant terme, la capacité de l'estomac est très petite et que, par conséquent, il faut donner très peu à la fois. En revanche l'estomac se vide plus vite et il est bon de répéter les repas toutes les heures. Avec cette méthode d'alimentation et l'usage des couveuses, Rotch a pu élever, avec le plus grand succès, des enfants nés avant terme.

Pour un enfant né vers la 28^e ou 30^e semaine de la grossesse on devra, d'après Rotch, prescrire de la façon suivante :

Graisse.....	1.00	pour cent.
Sucre	3.00	“
Mat. Protéïdes.....	0.50	“
Légère alcalinité — Vingt-quatre repas		
de 4 c. c. chacun. (un drachme)		

Il ne faut augmenter ces proportions qu'avec la plus