

LE PROGRES MEDICAL

Comment faut-il donner les alcalins dans les maladies d'estomac?

—Binet, (5 juillet 1919).

Les alcalins, suivant M. Binet, doivent jouer le rôle de régulateurs et leur emploi doit viser à maintenir à un niveau voisin de la normale la sécrétion chlorhydropeptique, tout en assurant le passage, dans des conditions optima, du chyme acide dans le duodénum. D'où l'opportunité, d'administrer les alcalins, non pas au moment de la douleur de façon à la calmer mais d'une façon continue, en dehors de toute sensibilité pathologique de l'estomac et pour la prévenir. En résumé, il faut prescrire les alcalins dans tout le cours de la digestion et non pas au moment de l'heure supposée de l'apparition d'une douleur, de façon à s'opposer aux symptômes d'hypersécrétion ou de spasme du pylore que le phénomène douloureux est susceptible de déterminer.

De quels alcalins faut-il faire usage? Avant tout et en majeure partie de bicarbonate de soude auquel on peut associer de la magnésie calcinée, de la craie préparée, du citrate, du sulfate ou du phosphate de soude. Une dose moyenne journalière, de 4 à 5 gr., nous a toujours paru suffisante pour parvenir au résultat désiré.

Un nouveau mode de traitement consiste à faire prendre les alcalins en solution étendue et de préférence le matin à jeun. Hayem recommande l'absorption à jeun de 150 à 250 gr. d'eau de Vichy à laquelle légèrement réchauffée on ajoute 6 gr. de sulfate de soude par litre.
