

à l'âge adulte. Bords du palais munis, au lieu de dents, de fanons ou lames de corne se repliant dans la bouche que vient clore la machoire inférieure plus large que la supérieure. Langue forte, mais adhérente au plancher de la machoire inférieure. Les fanons constituent les baleines du commerce qu'on emploie dans la monture des parapluies, corsets, etc.

1. **La Baleine mysticète**, *Balæna mysticetus*, Lin. *B. vulgaris*. *Baleine commune*, *baleine franche*; *common* ou *right whale* des anglais.—De 60 à 75 pieds de largeur. Dos nu, sans nageoire. Fanons nombreux et allongés.

C'est la plus recherchée pour l'abondance de sa graisse. Elle s'aventure souvent assez loin dans notre golfe et pénètre quelquefois jusqu'à l'eau douce. En 1853 on en captura une à Kamouraska qu'on vint dépécer à l'Isle-Verte et que nous avons pu examiner minutieusement. Elle mesurait 45 pieds de longueur et fournit 65 barrils d'huile. La bouche mesurait 12 pieds et portait 300 fanons de chaque côté, les plus longs mesurant 5 pieds. La langue seule produisit près de deux barrils d'huile. La couche de graisse revêtant tout le corps mesurerait de 10 à 14 pouces d'épaisseur.

2. **La Baleine gibbeuse**. *Balæna gibbosa*, Cuv. Vulgairement *Baleine à bosse*, *Hump-back*, *Hunch-back whale*.—De 50 à 60 pieds; corps moins gros que la baleine franche et fournissant moins d'huile, sa couche de graisse ne mesurant d'ordinaire que 6 à 8 pouces d'épaisseur. Très commune dans le Golfe.

Sous-genre BALEINOPTÈRE, *Balænoptera*, Lac. Ce sous-genre se distingue par une nageoire dorsale que n'ont pas les autres baleines.

3. **Le Baleinoptère gibbar**, *Balænoptera Physalis*, Cuv. *Balæna physalis*, Lacép. *Baleinoptère* de certains auteurs; *Finner*, *Northern Rorqual*, *Razor-backed Whale*, des anglais.—Plus grêle, mais presque aussi longue que la précédente. Beaucoup moins recherchée, yù qu'elle fournit bien moins d'huile et qu'elle est bien plus difficile à chasser, en raison