

5 Gen. SPIZELLA, Bonaparte.

Bec conique, un peu courbé. Pieds grêles; ongles modérément courbés. Ailes un peu pointues, atteignant à peu près le milieu de la queue; 1ère rémige un peu plus courte que la 2e, égale à la 5e; la 3e la plus longue. Queue un peu longue, fourchue, à pennes étroites. Des stries sur le dos seulement.

3 espèces dans notre faune.

1. Le Pinson des montagnes. *Spizella monticola*, Baird. *Fringilla*, Lin. *Zonotrichia*, Gray; *Spinetes*, Cab. *Passer Canadensis*, Brisson.—Angl. *Mountain Finch*; *Tree Sparrow*.—Longueur $6\frac{1}{4}$ pouces; ailes 3. Bec à mandibule supérieure noire, l'inférieure jaune. Parties supérieures d'un brun nuancé de roux et de fauve; croupion d'un brun jaunâtre. Deux bandes blanches sur les ailes avec une ligne claire au dessus des yeux. Dessous blanchâtre avec une tache de roux foncé au milieu de la poitrine. Pennes caudales bordées de blanc.

P. et RR. Ce Pinson se montre quelquefois, quoique très rarement, dans notre Province au printemps.

2. Le Pinson des champs. *Spizella pusilla*, Bonap. *Fringilla*, Wils. *Emberiza*, Aud. *Spinetes*, Cab.—Angl. *Field Sparrow*.—Longueur $5\frac{3}{4}$ pouces; ailes $2\frac{1}{3}$ pouces. Bec rouge. Couronne rousse. Dos souvent strié de noirâtre. Côtés de la tête cendrés, avec une raie brune en arrière de l'œil. Dessous blanc, jaunâtre antérieurement, sans tache sur la poitrine. Pennes caudales liserées de cendré.

P. et RR. De même que le précédent, ce Pinson ne se rencontre que très rarement en Canada.

3. Le Pinson gris. *Spizella socialis*, Bonap. *Fringilla*, Wils. *Emberiza*, Aud. *Spinetes*, Cab.—Vul. *Oiseau gris*; Angl. *Chipping Sparrow*.—Longueur $5\frac{3}{4}$ pouces; ailes 3. Bec noir. Front noir, séparé au milieu par du blanc. Couronne d'un brun uniforme. Une ligne noire de la base du bec à travers les yeux. Croupion d'un cendré clair. Dessous blanchâtre, sans aucune tache, lavé de cendré, particulièrement à travers la poitrine. Point de tache brune sur la poitrine ni de blanc à la queue.

PE. et CC. Le Pinson gris se montre d'assez bonne heure au printemps, pour ne nous laisser qu'à l'automne. Il niche dans les arbrisseaux, et pond de 4 à 5 œufs d'un