

- *8. *Ovis Montana*. (Cuvier.)—Mouflon ou mouton des Montagnes.
 *9. *Ovis Montana Dalli*. (Nelson.)—Mouflon de Dall. Cette variété récemment fixée ou nouvelle espèce de mouton est indubitablement celle qui se trouve dans les montagnes Rocheuses, à l'ouest du bas Mackenzie, tandis que le vrai mouflon (*bighorn*) habite les chaînes du sud.
 *10. *Ovibos Moschatus*. (Zimmerman.)—Ovibos ou bœuf musqué. Nombreux sur les steppes durant l'été; l'hiver, se tient à la lisière et dans la portion la plus septentrionale de la région boisée.
 *11. *Bison Americanus*. (Gmelin.)—Bison des bois. Très rare maintenant dans le district d'Athabaska.

CARNIVORA.

- *12. *Lynx rufus*. (Gmelin.)—Chat sauvage. Originaire, dit-on, de la section sud-ouest du territoire visé par l'enquête.
 *13. *Lynx Canadensis*. (Geoffroy.)—Lynx ou loup-cervier. Comme j'ai déjà donné dans mes réponses au questionnaire des renseignements sur le lynx et sur les autres animaux à pelletteries du bassin de la rivière Mackenzie, je n'ai pas besoin d'en dire davantage ici.
 *14. *Canis Lupus Occidentalis* var. *albus*. (Richardson.)—Loup blanc.
 " " var. *griseus*.—Loup gris.
 " " var. *ater*.—Loup noir.
 *15. *Canis latrans*. (Say.)—Coyote ou loup à moule. S'il ne traverse pas la Saskatchewan du Nord, il se trouve maintenant, à coup sûr, en deçà de la limite sud-ouest du bassin de la rivière Mackenzie.
 *16. *Canis familiaris* var. *Borealis*. (Desur.)—Chien esquimau.
 " var. *Lagopus*. (Rich.)—Chien montagnais.
 *17. *Vulpes fulvus*. (Fleming.)—Renard rouge.
 " var. *decussatus*.—Renard croisé.
 " var. *argentatus*.—Renard argenté et noir.
 *18. *Vulpes velox*. (Say.)—Chien de Prairie. Comme il est sur la liste du Dr Bell, je suppose qu'il se trouve en deçà des limites sud de la région.
 *19. *Vulpes Lagopus* (Linné)—Renard blanc.
 var. *fuliginosus*.—Renard bleu. Très rare dans l'Amérique anglaise arctique; si c'est le même animal que l'isatis de Pribylov et des autres îles alaskiennes, il a assurément droit à un rang spécial.
 *20. *Gulo Luscus* (Linné, Sabine.)—Carcajou. Répandu presque, sinon tout à fait, jusqu'à la mer Polaire.
 *21. *Mustela Penmanti* (Erxl.)—Pékan. Très rare, si toutefois il existe au delà du 60° degré de latitude nord.
 *22. *Mustela Americana* (Turton).—Martre.
 *23. *Putorius vulgaris* (Linné).—Belette. Plutôt rare dans l'Amérique arctique.
 *24. *Putorius Ermineus* (Linné)—Hermine. Assez commune dans tout le Bassin.
 *25. *Putorius longicauda* (Bonaparte).—Belette à longue queue. Se trouve, dit-on, dans cette région.
 *26. *Putorius Vison* (Brisson).—Vison ou foutreau.
 *27. *Mephitis mephitica* (Shaw.)—Putois. On ne l'a pas encore rencontré au nord de la latitude 60°; et ne se trouve qu'en très petit nombre jusqu'à un ou deux degrés plus bas.
 *28. *Taxidea Americana* (Schreiber.)—Blaireau. Rare même dans la section méridionale de la région en question.
 *29. *Lutra Canadensis* (Turton.)—Loutre de terre. Est loin d'être commune dans l'extrême nord, sur le Mackenzie.
 *30. *Ursus horribilis* (Ord.)—Ours gris ou grizzly.
 *31. *Ursus Arctos* (Richardson.)—Ours brun ou des steppes. N'est pas rare dans les steppes des rivières Anderson et Wilmot-Horton, ni sur les rivages de la baie de Franklin. Il habite aussi, dit-on, les montagnes Rocheuses sur le bas Mackenzie.