

Si le tuberculeux vient vous consulter au bureau, il est nécessaire, dans l'intérêt du patient, que le médecin le visite à la maison de temps en temps.

S'il s'agit de la classe absolument pauvre, et surtout des patients de dispensaire, il est difficile de faire de fréquentes visites à la maison, et il faut les confier aux soins des nurses de districts.

Les mesures hygiéniques qui ont pour but de prévenir la contamination doivent être les mêmes, chez le pauvre ou chez le riche, chez les patients ambulants ou au lit.

Au foyer domestique le patient doit se servir d'un crachoir avec large ouverture, ou d'une tasse spéciale pour recevoir les crachats.

Le vase doit être partiellement rempli d'eau.

Un crachoir élevé et stationnaire est préférable et ne doit jamais



Fig. 1. — Crachoir élevé dissimulé sous une jardinière-métal (Knopf).




Fig. 2. — Crachoir en nickel imaginé par le Dr. Knopf. Facile à mettre en poche et à manier avec une seule main.

être sans couvert. Il a été démontré que les mouches et autres insectes qui ont accès à l'expectoration tuberculeuse, deviennent ainsi les propagateurs de la maladie.

Quand le patient se promène, il doit se servir d'un flacon de poche, s'il est assez courageux pour le faire, ou expectorer dans une boîte en carton ou dans un morceau de chiffon.