

1. Philanthe solivague. *Philanthus solivagus*, Say.
Says. Ent. ii, p. 764.

♀—Long. .50 pce. Noir avec poils blancs abondants sur la tête et le thorax; le chaperon, la face au dessous des antennes, l'article basilaire de celles-ci avec une petite tache triangulaire entre les 2 de chaque côté, les écailles alaires, un point en arrière des tubercules, un autre au bas du prothorax en avant, une tache géminée sur le post-écusson avec les pattes en partie et des bandes sur l'abdomen, jaune. Les côtés de la face remontant jusqu'à l'échancrure des yeux, jaunes. Antennes renflées, noires, le premier article jaune et le 3e quelque peu roussâtre. Le post-écusson avec une ligne jaune interrompue au milieu, le propode avec une ligne enfoncée au milieu, densément ponctué, la face postérieure du métathorax légèrement excavée. Ailes subhyalines, un peu plus obscures à l'extrémité, la cellule radiale pointue aux 2 extrémités, les cubitales 2 et 3 rétrécies vers la radiale, leur ligne de séparation un peu oblique. Pattes jaunes, les hanches avec les cuisses, noires, celles-ci terminées de jaune, les jambes avec une tache noire en dedans vers l'extrémité, ciliées-épineuses de même que les tarses. Abdomen ovale, densément ponctué, les sutures, et surtout la première, légèrement enfoncées, les segments portant tous une bande jaune transversale, cette bande très large au premier segment, crénelée en avant, sinuée vers le milieu, ne formant sur tous les autres qu'une marge apicale interrompue au milieu sur le 2e, l'extrémité quelque peu roussâtre.—R.

♂—Le collier jaune, les flancs sans taches; le 6e segment abdominal ne portant qu'un petit point jaune de chaque côté.

Capturé à St-Hyacinthe. Rapproché du *ventilabris*, Fabr., mais s'en distinguant surtout par ses bandes abdominales diversement disposées.

2. Philanthe froid. *Philanthus frigidus*, Smith, Proc. Ent. Soc. Phil. v, p. 87, ♀ ♂.

♀—Long. .50 pce. Noir; une bande de chaque côté de la face, avec une autre au milieu remontant jusqu'entre les antennes et s'étendant en avant jusqu'au bord antérieur du chaperon, une tache sur les mandibules, une ligne interrompue sur le prothorax, un point en arrière des tubercules, les pattes avec taches à l'abdomen, jaune. Antennes noires, avec un point jaune sur le scape en dessous, le pavillon roussâtre à la base en dessous. Front avec poils blanchâtres. Thorax densément ponctué, l'espace renfermé du métathorax uni, triangulaire, sa pointe arrondie, polie, faisant un peu saillie. Ailes subhyalines,