

300 HISTOIRE NATURELLE

long, très-simple, terminé par une tête en forme de flèche.

Goeze, Eingew. tab. 31. fig. B. 16, 18. *Batsch*.
Bandw. fig. 103, 104. Encycl. pl. 47. fig. 5, 6, 7.
Se trouve dans les intestins du grand pic.

Tænia à collier, Tænia torquata.

La tête avec un anneau noir; le cou très-mince; les articulations courtes et larges; la dernière très-aigüe.

Bluch, Eingew. tab. 4. fig. 11, 13.

Se trouve abondamment dans les intestins du canard domestique et du pingoin.

Tænia fil, Tænia filum.

La tête arrondie, antérieurement obtuse; le cou simple; les articulations à peine visibles.

Goeze, Eingew. tab. 32. A. fig. 1, 7. *Batsch*,
Bandw. tab. 86, 87. Encycl. pl. 47. fig. 11 à 17.
Se trouve dans les intestins de la bécasse.

Tæn. infundibuliforme, T. infundibuliformis.

Les articulations infundibuliformes, dentelées; la partie antérieure de la tête alongée, cylindrique.

Goeze, Eingew. tab. 31. A. fig. 1, 6. *Pallas*.
Daytre. 1. tab. 23. fig. 29, 30. *Batsch*. Bandw. fig. 31.
91, 93, 164.

Se trouve abondamment dans les poules et les canards.

Tænia de l'étourneau, Tænia sturni.

Les articulations alongées; la partie postérieure enflée des deux côtés; le cou court et simple; la tête presque à quatre angles.

Goeze, Eingew. B. fig. 19, 21.

Se trouve dans les intestins de l'étourneau.