

bles s'exagèrent dans la position couchée sur ce côté. Quinze jours avant son admission dans nos salles Mme B., passe par une nouvelle crise; douleur très grande dans la région hypogastrique droite, elle est forcée de prendre le lit. Au repos ces symptômes semblent s'amender, mais réapparaissent avec plus d'intensité quelques jours plus tard. C'est à ce moment qu'elle réclame son entrée à l'Hôpital où nous la voyons pour la première fois. Figure anxieuse, langue chargée, souffrante, pouls rapide, température 100 F., ventre sensible. Du côté droit la paroi abdominale est soulevée par une tumeur grosse comme deux fois le poing, ronde, dure, douloureuse et peu mobile. L'opération immédiate est jugée nécessaire. Le lendemain après une préparation soignée la malade est laparatomisée.

Incision médiane. — La tumeur adhère par sa face antérieure au péritoine pariétal qui, à ce niveau, apparaît fortement congestionné.

L'épiploon gorgé de sang, et plusieurs anses intestinales sont accolés à la masse kystique, le dégagement de la tumeur détermine beaucoup d'hémorrhagie, tout ce que l'on touche semble saigner. Les parois du kyste sont œdémateuses, d'une couleur rouge, brun lie-de-vin, la cavité abdominale contient un liquide sero-sanguinolent assez abondant. Le pédicule assez charnu est tordu une fois et demi sur lui-même.

La tumeur enlevée, nous soignons particulièrement l'hémostasie, et le ventre est refermé par 3 plans de sutures. La convalescence est heureuse, retardée cependant par une suppuration de la paroi.

Dlle L., 51 ans, réglée à 15 ans, règles arrêtées depuis sa 48^e année. Santé antérieure bonne, parfois quelques douleurs au bas ventre, deux fois ces souffrances la forcent à suspendre pour quelques jours son travail.

Trois jours avant son entrée à l'Hôpital, la malade éprouve, soudainement, sans provocation appréciable, des douleurs violentes au bas ventre, elle vomit; cet état dure 48 heures, puis on la transporte dans la salle Ste-Marie où je l'examine. Depuis le commencement de la crise, la malade ne peut rien garder — son ventre est ballonné — sensible, surtout à gauche et en bas — pouls rapide — température 101° F. Par la palper ab-