

à dissoudre dans

Eau froide. . . . . 2 gr. 50

mêler avec :

Lanoline. . . . . 6 gr.

et ajouter :

Menthol. . . . . 0 gr. 10

Saccharine. . . . . 0 gr. 30

Vaseline. . . . . q. s. p. 15 gr.

La pommade coulant dans le cavum naso-pharyngien est plus susceptible d'agir que si on la faisait pénétrer par toute autre voie d'introduction.

*Pommade contre les hémorrhôïdes.* — Quand les hémorrhôïdes sont douloureuses ou après l'opération, employer les onctions à la pommade suivante :

Chlorhydrate de cocaïne . . . . . 0 gr. 10

Menthol . . . . . 0 gr. 20

Lanoline. . . . . 12 gr.

On peut remplacer la cocaïne par une même dose d'anes-thésine.

*Contre la coqueluche.* —

Une cuillerée à café toutes les trois heures, pour des enfants de 10 ans.

Infusion de racine d'Ipéca (0.50) . . . . . 180 gr.

Extrait de belladone . . . . . 0 gr. 08

Bromure de sodium . . . . . 2 à 4 gr.

Sirop d'alihéa. . . . . q. s. p. 200 gr.

Diminuer la dose si les enfants sont jeunes.

Dans le cas de convulsions, donner de fortes doses de bromure (1 gr. à 1 gr. 50 par jour, même pour les nourrissons) et des lavements au chloral. Supprimer le lait.

*Pour stimuler la croissance des enfants.* —

Bioxyde de manganèse. . . . . 0 gr. 25

Craie pulvérisée . . . . . 2 gr.

pour 25 paquets.

Donner un de ces paquets, avec un peu d'eau sucrée, avant les deux principaux repas. Aux enfants âgés de moins de 2 ans, on ne donnera qu'un paquet par jour.