

OBSTETRIQUE

Le traitement de l'éclampsie puerpérale par la méthode sanglante !
dans *Gazette des Hôpitaux*, 29 juillet 1911..

Voici l'analyse d'un travail allemand qui ne manque pas d'originalité, si non de folie. Je le donne comme un excès à éviter. Quelle est donc la mentalité de quelques-uns de ces chirurgiens allemands ?

"Sellheim annonçait, en octobre 1910, qu'il était parvenu à guérir deux cas désespérés d'éclampsie puerpérale où les crises avaient débuté ou persisté après la délivrance, une fois en injectant une solution d'iode de potassium dans le tissu glandulaire des seins, une autre fois en amputant les deux glandes mammaires. La toxine éclamptique hypothétique était, selon lui, abondamment développée dans les seins, et en les enlevant le principal foyer d'infection était extirpé. Cette méthode active de traitement chirurgical semblait donc justifiée dans des cas extrêmement urgents d'éclampsie persistante.

Herrenschneider (de Colmar) a publié l'observation d'un cas où il recourut à l'amputation (*Centrabl. f. Gynäk.*, n° 18, 1911). La malade était une primipare de dix-huit ans, admise à l'hôpital pendant le dernier mois de sa grossesse ; l'inconscience était absolue, la langue mordue et le facies absolument livide. Après plusieurs crises l'opération césarienne fut pratiquée et permit d'extraire un enfant vivant, du sexe féminin. Les convulsions continuèrent, très graves. Le jour suivant, les deux seins furent amputés et les convulsions cessèrent. Un coma postéclamptique suivit. Le surlendemain de la seconde opération la malade redevenit consciente, mais une pneumonie et de la manie postopératoire apparurent. La plaie abdominale, faite pour la césarienne, guérit le neuvième jour ; elle se ferma, mais il resta un trajet fistuleux. Au bout de la troisième semaine la malade expectora de grandes quantités de pus fétide. Après cinq semaines tout allait bien au point de vue obstétrical ; les plaies des mamelles amputées étaient bien cicatrisées après un peu de suppuration. Il y eut alors paralysie du nerf de la sixième paire à droite et l'expectoration redevint un peu fétide, mais la malade semblait convalescente.