

La révulsion constitue un moyen de premier ordre. Elle peut être faite au moyen de petits vésicatoires ou de pointes de feu. On l'essaiera, en général, au creux épigastrique. Les injections sous-cutanées d'eau dilatée, préconisées par Tripier (de Lyon), réussissent souvent très bien. Mais, quand l'auscultation donne des signes, même très légers, à un des sommets, la révulsion en ce point a souvent sur les vomissements une action des plus favorables ; cette particularité pratique importante a été bien mise en relief par Potain.

Les calmants de la toux les plus divers ont été essayés. Tous comptent des succès. Fonssagrives donnait par jour 4 à 5 grammes d'eau de laurier-cerise. Peter préférait, au moment de la quinte, cinq ou six gouttes de la solution de morphine au cinquantième. Le laudanum à dose de trois à quatre gouttes, les gouttes noires anglaises à dose d'une à deux gouttes sont indiqués quand les vomissements s'accompagnent d'une tendance à la diarrhée. Les bromures, la valériane peuvent trouver exceptionnellement leur emploi chez quelques sujets d'un nervosisme excessif. Guéneau de Mussy se servait beaucoup de la belladone. Il donnait après chaque repas une à deux des pilules suivantes :

Extrait mou de quinquina.....	0 gr. 10
Extrait de belladone.....	0 01

Pour une pilule.

La cocaïne, le menthol ont été également utilisés avec succès. Voici deux formules dues la première à Barié, la seconde à Leichtenstein.

1 ^e Eau de laitue	150 grammes.
Sirop de quinquina.....	20 "
Cocaïne.....	0,25 centigr.

Une cuillerée à soupe toutes les deux heures.

2 ^e Menthol.....	1 gramme.
Cognac.....	20 "
Sirop simple.....	30 "

Par cuillerées à café dans un peu d'eau d'heure en heure.

Mais le médicament le mieux indiqué est la créosote. Celle-ci est doublement indiquée et contre les vomissements et contre la tuberculose. Son action spéciale contre la toux émétisante a été bien démontrée par M. Jaccoud. Comment s'exerce-t-elle ? Peut-être la légère irritation stomacale déterminée par la créosote est-elle utile. Cette action se retrouve, en effet, avec d'autres irritants, la teinture d'iode à dose de cinq à dix gouttes dans un peu d'eau, l'acide phénique sous forme de cuillerée à bouche de sirop phénique. La créosote peut être donnée de la façon suivante :

Créosote.....	10 grammes.
Teinture de gentiane.....	20 "
Cognac	200 "
Vin de Xérès.....	800 "

Une à deux cuillerées à bouche après chaque repas. (Frantzel).