

mandés dans les cas d'intoxication aigue par les narcotiques. Le sulfate de cuivre est, de plus, l'antidote du phosphore; les doses sont, pour les adultes, 0 gr. 10 à 0 gr. 50 dans une potion gommeuse ou en paquet avec de l'amidon, et chez les enfants, 0 gr. 05 à 0 gr. 10.

Ces médicaments sont contre-indiqués chez les sujets atteints de diarrhée.

3. Vomitifs mixtes.

a) *L'émétique* (ou tartrate double d'antimoine et de potasse) produit parfois de la céphalée, de l'abattement et déprime les systèmes cardio-vasculaire et nerveux. Il est contre-indiqué chez les cardiopathes, les cachectiques, ainsi qu'aux âges extrêmes de la vie. Il sera administré à doses fractionnées (0 gr. 03 à 0 gr. 05 en tout).

b) *La poudre d'ipéca* est indiquée chez les enfants et les vieillards. Son action est rapide, mais brève. Son emploi, contre-indiqué dans les cas de lésions cardiaques, est recommandé pour les empoisonnements, les embarras gastriques non graves et les affections pulmonaires au début, les bronchites chroniques, la bronchite capillaire, la pneumonie des vieillards et même, d'après Dujardin-Beaumetz, pour l'hémoptysie. Les doses sont 0 gr. 50 à 2 grammes. On peut associer l'ipéca à l'émétique.

Émétique.	0 gr. 05
Ipéca.	1 gr. 50

Par M. Sheffler (*Journal de médecine de Paris*, n. 3, 15 janvier 1909, p. 39).



LA GALE.

L'auteur fait remarquer qu'on néglige trop souvent, après le savonnage et le bain sulfureux, de frotter les endroits où il y a des sillons avec un gros molleton imbibé d'un peu d'eau sulfureuse pour déchirer et ouvrir ces sillons, on peut même dilacérer ces derniers avec une épingle. Ce n'est qu'après qu'on enduira le corps tout entier avec une pommade soufrée quelconque, qui doit rester longtemps en contact avec les téguments (vingt-quatre heures si possible).

Pour calmer les dégâts causés à la peau par les acres et la frotte, on appliquera, matin et soir, de la pâte de zinc: par dessus, on poudre avec du talc, et on continue jusqu'à guérison.

Ce traitement, applicable dans un hôpital, peut-être, en ville, remplacé par le port, pendant deux ou trois jours, d'une chemise, d'un caleçon, de gants et de bas imprégnés de pétrole du commerce (se rappeler le danger d'incendie).

Pour les enfants, on prescrira:

Huile de camomille camphrée, 100 gr.

Baume Styrax pur, 20 gr.

Usage externe.

La frotte classique de la gale n'est pas utilisable chez les sujets présentant des furoncles, de l'ecthyma,

des lymphangites. On procèdera à une médication d'attente avant de prescrire la frotte.

Il arrive souvent que les démangeaisons réapparaissent après la frotte: l'auteur recommande de ne jamais en prescrire une nouvelle sans avoir retrouvé un acare, car on peut se trouver en présence d'un prurit autotoxique ou névropathique, qui sera aggravé par la frotte. Enfin, il existe de véritables acarophobes qui demandent sans cesse un traitement nouveau.

Inversement, on rencontre souvent des malades souffrants depuis longtemps pour des eczémats ou prurits généralisés et qui ne sont que des galeux.

Par Brocq (*Le Bulletin médical*, 12 février 1910).



LA PELADE

L'auteur est partisan de la théorie trophonévrotique et admet qu'il faut d'une part traiter le point de départ, et le point de départ du réflexe dento-pilaire, d'autre part l'état général qui le conditionne.

On commencera donc par examiner la bouche et les dents.

Quant au trouble cutané, on le soumettra aux trois ordres de moyens que voici:

1. Propreté rigoureuse de la tête réalisée par des lavages journaliers à l'eau chaude et au savon de goudron ou de panama.

Cheveux courts si possible, pour les hommes et les enfants tout au moins.

2. Le massage, énergiquement appliqué au cuir chevelu entier et à la barbe, plusieurs fois par jour, si possible.

3. Après le massage, on frictionne à la brosse les plaques avec, chez les enfants, la solution suivante:

Eau-de-vie camphrée, 100 gr.

Huile de ricin,

Teinture de cantharides, à à 5 gr.

Surveiller les reins.

Chez les adultes, on prescrira:

Alcoolat de Fioraventi, 50 gr.

Eau de Cologne, 25 gr.

Teinture de capsicum, 3 à 8 gr.

S'il s'agit de plaques limitées et rebelles:

Acide phénique neigeux,

Teinture d'iode,

Hydrate de chloral, à à P.E.

Ce dernier topique, plus irritant, ne doit être employé que tous les quatre à cinq jours, suivant la résistance des tissus.

Le matin au réveil, on peut lotionner rapidement tout le cuir chevelu avec:

Essence de térébentine, 15 gr.

Ammoniaque, 5 gr.

Alcool camphré, 100 gr.

Par Marherbe (*Journ. des mal. cutanées*, Fasc. IX, 1909).