

Dans l'hypochlorhydrie, il y a aussi déficit en pepsine. On fera bien d'en donner avant le repas. Surtout la pepsine en écaille, la pepsine extractive, 0.25 à 2 gr. par jour. Mieux vaut encore donner la pepsine en cachets ou en potion. Quelques auteurs ont prétendu qu'elle était inutile parce que l'estomac ne sécrète que la propepsine qui est convertie en pepsine par elle, et que du moment qu'il y a de l'acide, cette fonction se régularise. Il y a toujours de la propepsine.

On donne aussi des peptones, dans un bouillon très chaud, $\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{2}$ heure avant le repas.

Exciter les mouvements de l'estomac et favoriser la sécrétion gastrique: On donne les amers et surtout la noix vomique:

Tr. noix vomique	} aa 5 gr.
" Gentiane	
" Colombo	
" badianes	

XV gouttes avant chaque repas.

Chez les malades qui accusent surtout une pesanteur au niveau de l'estomac après les repas et des renvois dont le goût rappelle celui des aliments, on donne la solution chlorhydrique avant le repas et la pepsine ou papaine après le repas.

Un bon moyen de stimuler les mouvements de l'estomac et d'exciter la sécrétion gastrique, c'est le repos après le repas avec application chaude sur le ventre. C'est une erreur de croire qu'il faille faire de l'exercice après le repas. Je conseille donc de rester 15 à 30 minutes sur le lit ou sur la chaise longue avec une compresse chaude sur le ventre. (Coton absorbant recouvert de taffetas.)

3°—*Combattre la douleur et les fermentations secondaires.*—Dans certains cas avancés avec dilatation, il arrive que l'on a des douleurs 4 à 5 heures après les repas. Cela tient à la non-digestion de certains produits et aux fermentations qui en résultent. Il est utile alors de donner à 11 heures du matin et à 5 heures du soir une des poudres suivantes:

Bicarbonate de soude	0.75
Poudre de noix vomique	0.05
Benzonaphtol	0.25

Dans ce but, on donne encore, loin des repas, des eaux minérales alcalines. (Vichy, Célestins).

4°—*T. symptomatique.*—Il vise surtout la constipation, la diarrhée et la dilatation.

La dilatation fera le sujet d'un chapitre spécial.

La constipation est fréquente. Pour la combattre, je prescris l'acide chlorhydrique qui est un excellent antiseptique gastrique et intestinal.