

avec du papier vernissé ou du cuir, d'employer des bandes en caoutchouc pur, qui peuvent être mieux nettoyées que celles qui sont fabriquées avec des fils de caoutchouc entourés de soie ou de coton.

—
TRAITÉ PRATIQUE DES MALADIES DES VOIES URINAIRES, par Sir Henry Thompson, professeur de clinique chirurgicale et chirurgien à University college hospital, etc., etc., traduit par MM. E. Martin, E. Labarraque, V. Campenon, internes des hôpitaux de Paris, précédé des leçons cliniques, par H. Thompson, traduites par les docteurs J. Hue et F. Gignoux. *Traité de l'hypertrophie de la prostate.* (1)

A une précieuse reproduction d'un ouvrage de pathologie spéciale très-estimé, les traducteurs ont eu l'heureuse idée d'ajouter un résumé de travaux français les plus récents. Certains points sont complétés par d'autres, et on connaît ainsi mieux les dissidences avec les chirurgiens français.

Nous voyons par exemple, en anatomie, que l'auteur a pratiqué un grand nombre de mensurations de l'urètre et que les résultats diffèrent très-notablement de ceux qu'ont obtenus nos anatomistes. Il attribue au canal de l'urètre une longueur de 17 cent. 50 sur le vivant, et de 21 cent. 50 chez le cadavre, tandis que M. Richet admet chez le cadavre que cette mesure varie entre 14 et 16 centimètres.

Sur quelques autres points nous trouvons encore des dissidences. Signalons en passant l'observation suivante, d'après M. Thompson.

La diathèse goutteuse est cause des rétrécissements spasmodiques, une urine trop acide irrite une muqueuse sensible.

Toutes les méthodes de traitement des rétrécissements sont passées en revue, et M. Thompson arrive à déclarer qu'aucune méthode ne peut convenir à toutes les variétés de rétrécissements que l'on peut rencontrer. Il déclare aussi que nulle méthode ne prévient la récurrence de l'obstacle.

Un des chapitres intéressants du livre est celui du traitement de l'augmentation de volume de la prostate, consistant surtout à pallier la douleur. C'est de ce chapitre que nous tâcherons de donner un résumé assez complet.

Les moyens thérapeutiques à employer dans ce cas d'augmentation de volume de la prostate, Thompson les range en trois classes : traitement des effets de la rétention ; traitement général et régime à suivre pour les malades atteints d'hypertrophie de la prostate ; traitement dirigé contre l'hypertrophie elle-même.

Dans la première division, l'indication qui tout d'abord se présente est celle de l'évacuation complète de l'urine ; pour cela le

(1) Un vol. de 1000 pages in-8, chez J. B. Baillière.