la glace des lacs, ils aient retiré leurs appas tout couverts de larves de Phryganes, entraînant avec elles leurs étuis de feuilles de sapin, de brins d'herbes etc.

Cette Famille ne renferme que les 2 genres qui suivent.

Antennes aussi longues que les ailes, celles-ci plus ou moins poilues . . . . . 1. PHRYGANEA.

Antennes plus courtes que les ailes, celles-ci nues ou à pubescence très courte, à peine perceptible . . . . . 2. NEURONIA.

Gen. 1. PHRYGANE. *Phryganea*, Linn.

(De *Phryganea*, menu bois, fagot; allusion à l'étui des larves).

Tête courte, transversale. Antennes robustes, aussi longues que les ailes ou peu s'en faut. Article basilaire court et plus fort; 3 ocelles. Palpes maxillaires de 4 articles ♂, de 5 ♀. Ailes antérieures couvertes d'une pubescence dense, comme un feutre, le sommet souvent un peu prolongé. Une nervule transverse oblique entre la costale et la sous-costale vers le bout terminal. Épérons 2, 4, 4.

Une seule espèce rencontrée.

Phrygane cendrée. *Phryganea cinerea*, Walk.—Long. 1 pouce; extension des ailes 1.20 pouce. Testacée avec stries cendrées en dessus. Ailes supérieures brunes, avec nombreuses taches cendrées, les inférieures brun-cendré. L'extrémité des jambes et des articles des tarsi antérieurs noire.—PC.

Assez rare dans les environs de Québec.

Gen. 2. NEURONIE. *Neuronie*, Leach.

Ne diffèrent des Phryganes que par une pubescence moins prononcée, les ailes en paraissant dépourvues, celles-ci étant d'ordinaire plus larges, à sommet nu ou presque nu. Antennes plus courtes que les ailes.

Plus communes que les Phryganes. Quelques espèces présentent une ornementation en couleur simulant celle des Panorpes. Six espèces rencontrées.

Pattes noires;

Ailes postérieures avec une large bande jaune sub-apicale . . . . . 1. **pardalis.**