

FACIAL NERVE.

Involvement of
the Nerve Trunk.

Nuclear
Paralysis.

愁肌不癱、面肌志動之受累、較情動者爲甚、其面之癱、與臂腿之癱同偏、蓋其絲橫過於延腦之處、(見第三十九圖)然其絲亦有不相交者、是謂之直絲、或能司面之上肌、故其肌不癱也。

(二)結癱、此蓋延腦司所之病致之、然僅此結患者、實爲甚少、其狀與面幹癱無異。

(三)面系幹癱、此或名結下癱、

病原 (甲)系之本結在小腦下房、其系經腦橋而出於其後旁之面、如腦橋下段傷者、則有叉癱之患、即受傷一偏之面癱而彼偏之臂腿癱也、其所以成此叉癱、蓋其傷處在交點以上之故、(見第三十九圖)如腦橋之上段傷者、則受累者惟未交之絲、即結上之絲、故其患癱之面臂腿與傷處同偏。

(乙)系出腦橋之處、或爲癰、瘰癧、腦衣炎、顱底骨折等所累。

(丙)系經顱骨面系管之時、或爲耳病所累、如中耳病而骨癰是、其原如是者、以孩童爲尤常。

(丁)系出錐孔之時、易受外傷、故割取此處之瘤、其系或誤斷焉、胎兒者或爲助產鉗所傷。