

Comment Reconnaître Certaines Maladies Affectant les Agneaux

Moyens de Prévention et Traitements

Nom de la maladie	Symptômes	Traitements
<p>BROCHO-PNEUMONIE INFECTIEUSE DES AGNEAUX (Maladie du rinde). Saison d'apparition: l'automne.</p>	<p>Atteint les agneaux de 1, 1½, 2 ou 3 mois.—Évolue lentement et progressivement.—Les malades mangent jusqu'à la fin, maigrissent, s'anémient et meurent en 10 à 15 jours.—Au début, l'animal est moins gai, nonchalant, moins en appétit, pas ardent à téter et laisse entendre une toux faible. La maladie s'aggrave de jour en jour, puis les malades restent couchés, ont une fièvre modérée, une respiration accélérée, une toux accentuée qui devient pénible, quinteuse avec un jétage d'abord comme de l'eau puis qui s'épaissit et devient visqueux et plus tard jaunâtre. Les narines sont souillées par le jétage desséché.—Quelquefois les malades peuvent à peine se tenir debout et restent comme figés. Si l'on veut les déplacer, ils tombent sur le côté ou la tête en avant et restent étendus, les membres bien allongés.</p>	<p>Marquer et isoler tous les malades et les douteux amaigris ou nonchalants ainsi que leurs mères.—Évacuation de la bergerie et désinfection à fond de celle-ci.—Dans les locaux où sont gardés les malades, on fera, deux fois par jour, des pulvérisations d'une solution désinfectante.—Si la maladie s'étend, rététer le cas à votre médecin vétérinaire.</p>
<p>SEPTICEMIE DES AGNEAUX. Saison d'apparition: le printemps.</p>	<p>Apparaît dans la première semaine de la vie.—Tristesse, refus de téter, faiblesse générale. Malade vacillant pendant la marche ou la station debout, semble comme hébété.—Mort survient quelquefois en 24 heures.</p>	<p>Isolément des malades, désinfection des litières, pansement du nombril avec de la vaseline iodée ou de la glycérine iodée pendant 8 jours.</p>
<p>INFECTION OMBELICALE (Néorbailliose Omphalite). Saison d'apparition: le printemps.</p>	<p>Affection du début de l'existence—nombre restreint de sujets frappés.—À l'âge de 5, 8 ou 15 jours, les agneaux paraissent nonchalants, sans forces. Peu après, ils peuvent à peine se lever et se traîner pour téter, puis ils s'affaiblissent et meurent en 1 à 2 jours, période qui ressemble à une agonie.</p>	<p>Limité à la prévention.—Isolément des adultes atteints de suppuration quelconque, isolement des petits malades, désinfection de la bergerie, pansement du nombril à la vaseline iodée ou à la glycérine iodée.—Ce traitement peut s'appliquer à tous les agneaux de la bergerie et permet d'arrêter la maladie.</p>
<p>RHUMATISME INFECTIEUX (Maux de jointures). Saison d'apparition: le printemps.</p>	<p>Coexiste avec les Maux de nombril.—Se manifeste par des boiteries et des déformations des jointures.—Les agneaux deviennent nonchalants, tristes, peu ardents à téter.—Il y a enflure du nombril où on voit quelquefois un abcès.—Quand les jointures sont touchées les malades restent couchés le plus longtemps possible. Si on les soulève, on les voit boiter ou refuser de rester debout.—Les jointures malades sont gonflées, très sensibles, molles ou dures. La mort, chez les impotents, arrive en 2 à 3 jours.—Chez les simples boiteux, il y a amaigrissement progressif et mort par épuisement.</p>	<p>Mesures préventives.—Séparez et isolez des autres les malades et leur mère ou leur nourrice, désinfectez la bergerie et les litières.—Quand il y a beaucoup de malades, pansement du nombril à la vaseline iodée le jour de la naissance et le troisième jour ou encore avec de la glycérine iodée. Consultez votre médecin vétérinaire pour plus amples informations.</p>

Service de l'Élevage - Section de la Médecine Vétérinaire
Ministère de l'Agriculture - Province de Québec