

**Traitement des dents chez les enfants, par CRAVENS.** — Les enfants au-dessous de 3 ans ne sont pas amenés au dentiste, on les conduit au médecin de la famille.

Quand le dentiste est appelé à dire son avis, son devoir est de rappeler l'importance de conserver les dents caduques aussi longtemps que possible.

Il y a plusieurs raisons pour conserver ces organes jusqu'à ce que les dents de remplacement soient prêtes à faire leur éruption.

Les premières, toujours régulières dans leur disposition, sortent par groupes, et la présence de plusieurs groupes fournit une indication qui permet de déterminer l'âge approximatif du sujet, la période du développement de certains organes cachés, l'estomac en particulier, et d'en conclure quel est le régime nécessaire au développement ultérieur de l'organisme. Cette indication est assez claire pour que tout dentiste intelligent et observateur en puisse tirer profit.

Chez l'adulte, les masséters sont les muscles les plus puissants ; ils sont capables de soutenir les poids du corps suspendu et souvent plus ; mais dans l'enfance, les masséters ne possèdent pas une puissance proportionnelle, de sorte que, souvent, la mastication d'aliments solides ou fibreux serait extrêmement difficile, sinon impossible, n'était la présence de tubercules particuliers aigus qui arment les dents et qui servent à broyer vite et facilement des substances qui, autrement, descendraient forcément en masse dans l'estomac et sans avoir été insalivées.

Cette facilité qu'ont les dents de lait à découper les aliments, a comme corollaire un estomac de capacité digestive très limitée. Sous ce rapport, les dents caduques, dont l'éruption est récente, présentent quelque analogie avec la troisième période de l'abrasion mécanique si fréquente chez les vieillards, et que l'on a comparée à une seconde enfance, parce que les bords tranchants des dents usées permettent aux gens âgés de diviser leurs aliments.

Les épines que présentent le bord tranchant des incisives, nouvellement sorties, d'un enfant, possèdent un pouvoir étonnant de pénétration ; mais à mesure que l'âge augmente, les masséters deviennent plus forts et les épines disparaissent bientôt, en laissant un bord uni qui est mieux adapté à l'état du sujet en voie de développement.

Les dents adultes sont de 1/3 à 1/2 plus grosses que les dents de lait, et exigent pour se loger une arcade alvéolaire de dimensions environ deux fois plus grandes.

Ce développement de l'arcade commence d'ordinaire vers la sixième année, et exige environ six ans pour se terminer. Quelquefois, on trouve des sujets de six ans chez qui les centrales permanentes du bas franchissent la gencive en arrière des incisives caduques et gênent les mouvements de la langue. Six mois plus tard, les latérales inférieures sortent sur le même plan que les