Les enfants supportent bien les hautes doses d'antipyrine, qui agit bien dans ces cas, à condition que le rein soit bon. 2º Arsênic sous forme de liqueur de Boudin. Au-dessous de sept ans. Liqueur de Boudin...... 5 grammes' Potion gommeuse. 120 Une cuillerée à soupe de deux heures en deux heures. Au-dessus de sept ans, augmenter de 5 grammes par jour jusqu'à 20 à 30 grammes, par jour, dose maxima. On redescend ensuite de la même façou. S'il y a nausées, vomissements, suspendre durant 6 à 7 jours. Coqueluche: 1° Bromoforme...... XLVIII gouttes' Une cuillérée à thé renferme deux gouttes. Ne jamais donner ce médicament au dessous de 2 ans. Commencer par 4 gouttes jusqu'à 30 à 40 gouttes en en surveillant l'action. 2° L'Antipyrine agit très bien aussi. On peut donner 4 à 5 grammes, par jour à un enfant de 10 ans... soit 0 gr. 50 centig. par année d'âge... Rhumatisme articulaire aiguë: (a) Régime lacté -Prescrire le salicylate de soude à hautes doses : 4 à 8 grammes par jour jusqu'à disparition des phénomènes douloureux. Diluer le salicylate dans une assez grande quantité d'eau de Vichy, pour éviter l'irritation de l'estomac. On peut aussi prescrire Salicylate de soude...... 1 gramme Bicarbonato de soude...... 2 Pour 1 paquet: 4 à 8 dans la journée dans une infusion chaude. (b) localement: Pansement humide après application locale d'un des liniments suivants: Ou bien: Surveiller les urines. Si le salicylate est contre-indiqué (femmes enceintes), cardiopathies, néphrites chroniques, alcoolisme, athérome artériel, donner 3 fois dans la journée 1 cachet de : On peut aussi prescrire l'aspirine et le salophène à la dose de 2 à 4 gram. par jours (1).

^{(1) —} Extrait du Formulaire Aide-mémoire de J. Génévier, chez Stoinheil, éditeur, à Paris, édition 1910.