

tant des fibres musculaires et du système nerveux, diurétique faible. — *Ind.* : Faiblesse du myocarde, cardiopathies, asthénie cardiaque, anémies graves, adynamies, empoisonnements. — *Pos.* : Chez l'enfant: jusqu'à 0 gr. 25 par 24 heures; chez l'adulte, jusqu'à 2 grani. — *Inj.* sous-cut. — *Douloureux.* Tiédir la solut. au moment d'injecter.

*Caféine* (Citrate de). — *P. T.* : Andidyspnéique. — *Pos.* : 0 gr. 10 à 0 gr. 20 en solution eau salée. — *Peu usité.*

*Camphre*. — Insoi. eau; sol. éther, huiles, alcool. — *P. T.* : Antispasmodique, stimulant énergique des centres nerveux. — *Ind.* : Collapsus. Asthénie. — *Pos.* : Chez l'adulte seulement, 1 à 5 cc. solut. huileuse à 10% ou sol. éther à 0 gr. 10 par cc.

*Cholestérine*. — (V. *Extrait de bile*).

*Cicutine*. — *F. us.* : Bromhydrate. — *P. T.* : Antispasmodique modérateur des réflexes. — *Pos.* : 1 à 4 milligr. par 24 h. — S eau. — *Peu usité.*

*Cinnamate de soude*. — Cinnamate de soude, 0 10; sérum physiologique. q. s. pour 1 cc. (Dr Lautier). — *Ind.* : Tuberculoses médicales et chirurgicales; tuberculose pulmonaire à tous les degrés, pourvu que le malade soit sans fièvre. — S'abstenir si l'injection amène une élévation de température de plus d'un degré chez un malade d'ordinaire apyrétique. — *Pos.* : 0 gr. par cc. en solution dans sérum physiologique; 2 à 6 inj. par semaine, dans tissu cellulaire s.-cutané ou en plein muscle. Faire une série de 60 inject. — Laisser reposer pendant un ou plusieurs mois et reprendre s'il y a lieu. — *Résultats.* — Amélioration ou guérison dans le plus grand nombre des cas à tous les degrés.

DR LAUTIER (Bordeaux).

*Citrate de fer vert*. — (V. *Fer*).

*Citrate de fer ammoniacal*. — (V. *Fer*).

*Cocaine*. — *F. us.* : Chlorhydrate (82.2% de cocaine). — *P. T.* : Anesthésique local par excellence. — *Ind.* : Anesthésie locale;