

Quatre genres dans notre faune qu'on peut ainsi séparer les uns des autres.

- 1 (4) Deux dorsales distinctes ;
- 2 (3) Tête médiocrement épineuse ; d'eau douce.. 1. *COTTUS*.
- 3 (2) Tête fortement épineuse ; de mer 2. *HEMITRIPTERUS*.
- 4 (5) Première dorsale remplacée par des épines. 3. *GASTEROSTEUS*.
- 5 (4) Première dorsale absolument nulle.. 4. *ASPIDOPHORUS*.

1. Gen. *CHABOT*. *Cottus*, Artedi.

Tête très déprimée, plus ou moins tronquée en avant, ne se distinguant du reste du corps que par sa plus grande largeur. Une seule épine à l'angle du préopercule ; quelquefois une seconde plus petite, cachée sous la peau et perceptible seulement au toucher au bord inférieur du préopercule. Seconde dorsale plus haute que la première. Ventrals à 3 ou 4 rayons mous. Ligne latérale ordinairement interrompue.

Nous n'avons encore rencontré que l'espèce suivante, mais il est probable qu'il en existe plusieurs autres dans notre Province. Le peu d'importance de ces petits poissons fait que généralement ils ne sont pas remarqués.



Fig. 17.

Le Chabot grêle. *Cottus gracilis*, Heckel ; *Uranidea quiescens*, Dekay ; *Cottus gobio*, Ayres, Fig. 17.—Angl. *The River Bull-Head*.—Longueur $2\frac{1}{2}$ pouces. Couleur verdâtre avec taches brunes plus grandes dans la partie inférieure. Tête plus large que le corps qui va se rétrécissant graduellement jusqu'à la queue et portant deux épines sur la nuque.

Première dorsale à 8 rayons, commençant environ au tiers de la longueur de la pectorale.

Deuxième dorsale à 16 rayons, très rapprochée de la 1re, un peu plus haute qu'elle, de forme à peu près quadrangulaire.

Pectorales larges, plus hautes que la longueur de la tête.