

devancera jamais la charité très agissante des commères et des bonnes femmes à son endroit, croyez-en mon expérience.



LES PHILACOGÈNES DANS LA PNEUMONIE.

La pneumonie lobaire est peut-être la maladie qui a le plus déjoué le traitement médical. On doit reconnaître qu'il n'y a aucun vrai médicament spécifique de cette maladie. La mortalité est relativement très élevée comparée aux autres maladies infectieuses. C'est pourquoi un médicament qui est presque le spécifique de la pneumonie lobaire : tel est le philacogène de la pneumonie ; doit être considéré par la profession médicale.

Dans l'usage du philacogène de la pneumonie comme de tous les divers autres philacogènes ; il faut bien observer certains détails d'administration, qui ont une importance capitale sur le résultat. Ce produit peut être administré en injections sous-cutanées ou intra-veineuses. La première dose doit toujours être donnée en injections sous-cutanées. Les injections doivent être faites aussi lentement que possible. Dans une injection hypodermique la pointe de l'aiguille ne doit pas atteindre l'aponévrose musculaire. Certains malades n'absorbent pas le philacogène assez rapidement pour qu'il produise l'effet désiré s'il est administré en injection sous-cutanée. De tels cas réagissent promptement à des petites données en injections intra-veineuses.

Il faut éviter les hautes doses primitives. Un Cc sera suffisant pour la première dose en injection sous cutanée, et pour les personnes faibles il est prudent de ne pas dépasser $\frac{1}{2}$ Cc. La dose ira en augmentant de $\frac{1}{2}$ à 1 Cc. par jour, suivant l'effet produit par la dose précédente sur la température et le pouls. Une température et un pouls revenus à l'état normal seuls permettront de faire une nouvelle injection.

La première dose intra-veineuse, qui aura toujours été précédée d'une ou de plusieurs doses sous cutanées, ne devra pas dépasser $\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{4}$ Cc (2 à 4 gouttes). On augmentera la dose de $\frac{1}{8}$ à $\frac{1}{2}$ Cc, par jour, suivant les indications de la réaction.

Le philacogène de la pneumonie vendu en flacons de 10 Cc. fermés avec un bouchon en caoutchouc ne s'altérera pas au contact de l'air l'orsqu'on ouvre le flacon vu qu'il renferme un antiseptique.