

au deuxième nous doublerons; du troisième au sixième mois nous augmenterons jusqu'à six onces, de six à dix mois nous pousseront la dose jusqu'à huit onces.

A mesure que la quantité est augmentée les intervalles entre les repas doivent également augmenter.

Le tableau suivant fera comprendre clairement cette méthode qu'il faut suivre.

AGE.	INTERVALLES DES REPAS.	NOMBRE DES REPAS DANS 24 HRS.	MOYENNE DE LA QUANTITÉ A CHAQUE REPAS.	MOYENNE DE LA QUANTITÉ DANS 24 HRS.
1 ^{re} semaine.	2 heures.	10	1 once.	10 onces.
1 ^{re} à 6 sem.	2½ heures.	8	1½ à 2 onces.	12 à 16 onces.
6 à 12 semaines, et si néces- saire jusqu'à 5 à 6 mois.	3 heures.	6	3 à 4 onces.	18 à 24 onces.
à 6 mois.	3 heures.	6	6 onces.	36 onces.
à 10 mois.	3 heures.	5	8 onces.	40 onces.

L'irrégularité dans les tétées, les tétées fréquentes et les intervalles trop prolongés modifient beaucoup la composition du lait. Ainsi des tétées fréquentes diminuent la quantité d'eau et augmentent la partie solide du lait qui ressemble alors à du lait condensé, tandis que de trop longs intervalles, amoindissant la partie solide, rendent le lait trop aqueux.

Ces modifications qui surviennent dans le lait doivent donc nous faire comprendre que les règles prescrites ont leur raison d'être dans le premier cas; en effet, nous pouvons causer des désordres dans la digestion de l'enfant par un lait trop épais; dans le deuxième, nous n'aidons pas la nutrition puisque le lait se trouve trop étendu d'eau.