

Quelqu'un suggéra alors de faire paturer la première récolte ; et ce moyen réussit parfaitement. Les animaux en mangeant les têtes au moment ou même avant la floraison, détruisaient et œufs et larves qui s'y trouvaient renfermés. On n'a plus alors à redouter que les éclosions qui peuvent se faire sur les trèfles en dehors des cultures, et la négligence de ceux qui retarderaient à employer le remède ; car la recette pour être efficace exige une application générale.

La version française de cet important rapport sera prochainement livrée au public.

*Fourth Report of the United States Entomological Commission.*—Washington, 1885.

Ce Rapport, volume in-8 de 548 pages, avec 64 planches dont quelques unes coloriées, n'étant qu'une nouvelle édition du Bulletin No 3 de la même Commission, s'occupe presque exclusivement des insectes nuisibles au coton, et plus particulièrement des deux plus redoutables, les chenilles de la noctuelle *Aletia hyalina*, Say (Cotton-Worm) et celles de la noctuelle *Heliothis armigera*, Hübner. Ce volume qui a un intérêt tout particulier pour les régions où se cultive le coton, renferme encore une foule de détails précis et scrupuleusement notés sur la vie et les habitudes des insectes dont tous les entomologistes peuvent faire leur profit.

Nos remerciements à M. Riley, le Président de la Commission, pour l'envoi de ce volume.

---

*Nos lecteurs voudront bien nous pardonner le retard de ce premier numéro de notre nouveau volume, nous avons cru, dans l'intérêt de notre santé, devoir prendre quelques semaines de vacance. Nous espérons reprendre tout prochainement le temps perdu.*