

A. C. Se rencontre fréquemment dans le golfe surtout en automne. Comme tous les canards de mer, la Macreuse se nourrit presque exclusivement de poisson, de là cette chair huileuse et peu estimée qu'elle présente. Elle niche au Labrador, et pond de 5 à 6 œufs d'une couleur crème quelque peu verdâtre.

#### 10. Gen. EIDER. *Somateria*, Leach.

Bec comprimé et appointi à son extrémité que termine un énorme crochet l'occupant tout entière, Plumes du front s'avancant en pointe sur le bec jusque que vers sa moitié. Narines en avant du milieu de la commissure. Queue de 14 pennes, courte et pointue.

1. **L'Eider ordinaire.** *Somateria mollissima*, Leach; *Anas moll.* Linn. *Platypus mollissimus*, Brehm.—Vulg. *Canard Eider*. Angl. *Eider Duck*.—Long. 26 pouces; ailes 11.24; tarses 1.82; commissure 2.53. Le blanc est la couleur dominante; les côtés du corps, la partie postérieure du dos, le croupion et la queue sont noirs. Les plumes du front s'avancant sur le bec étroitement marginées de violet noir, cette couleur se continuant en une ligne qui se bifurque vers le milieu de l'œil pour se prolonger de chaque côté en s'élargissant jusqu'à la nuque, le blanc bordant cette bande noire, avec teinte verdâtre. Le blanc est souvent lavé de rose à la poitrine.

A. C.—L'Eider est très commun dans le golfe, surtout en automne, On sait que le riche duvet que porte ce canard de mer le fait particulièrement rechercher. Il niche au Labrador. La femelle pond de 8 à 10 œufs d'un jaune-pâle sale, dans un nid qu'elle se construit dans les herbes près des eaux.

2. **Eider remarquable.** *Somateria spectabilis*, Leach; *Anas spec.* Linn. *Fuligula spec.* Bon.—Vulg. *Canard à tête grise*; Angl. *King Eider*.—Long. 21.50 pes. ailes 10.70; tarses 1.06; commissure 2.50. Corps et ailes noirs, la partie antérieure aux épaules, la région intestreapulaire en partie, la plus grande partie du cou et de la gorge, blanc. Une petite bande tout autour de l'œil avec une tache en forme de V sur le menton, noir. Sommet de la tête et nuque d'un cendré bleuâtre tacheté de noir; côtés de la tête teintés d'un vert d'émeraude. Milieu des couvertures alaires, extrémités des secondaires, les axillaires et la plus grande partie de la surface inférieure de l'aile avec une tache de