in dont on se initiative mier de fer le sol par si le répan , mais il a terre par

mposé peut emps. Il en de lin et

it. Le sang culture.

Engrais chimiques.—Les engrais chimiques ployés comme auxiliaires du fumier de ferme, une importance considérable dans la culture tabac; leur emploi isolé cependant dans un dépourvu d'humus ou de matière végétale, ne duirait que de bien faibles résultats.

Le tabac, pour parvenir à son complet déoppement, doit trouver dans le sol l'azote qui est nécessaire et qu'il ne soutire pas d'ailleurs.

L'engrais azoté le plus prompt, le plus imdiatement assimilable par les plantes est le rate de soude et après lui vient le sulfate d'amrate de soude et après lui vient le sement pulvéris niaque. Ces deux produits sont rarement lés au sol avant le semis : à cause de leur antage dan inde solubilité, on les distribue à la terre sujet de d'ès que la transplantation est opérée. La dose trême de ces deux engrais est de 150 lbs à le phosphor pent. On les mélange intimement avec 3 se disting leur volume de sable, de cendre ou de qu'ils fournistissière afin de les distribuer plus uniformément sol. On les répand sur le pourtour des racines oués au sol plants, aussitôt leur reprise assurée et sursson dessécat avant de leur donner les premières façons

zoté, il s'en La Potasse.—Aucune plante ne soutire du me dose que autant de potasse que le tabac, et le fumier ferme n'en contient pas suffisamment pour les