

REVUE DES JOURNAUX

L'ULCUS DU DUODENUM

(Suite)

Par le Dr Albert MATHIEU,
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine

Mais, à côté de l'ulcus juxta-pylorique dénommé à tort ulcus duodénal par les Anglo-Américains, il y a des cas d'*ulcus duodénal vrai*, dans lesquels l'ulcération siège à distance du pylore, en plein duodénum, sans aucun contact avec l'anneau pylorique sans que celui-ci soit entamé ou touché. Ces faits d'ulcus duodénal vrai sont, à l'autopsie ou sur les pièces de résection, beaucoup plus rares que les faits d'ulcus pylorique ou d'ulcus mixte. Sur 22 pièces d'autopsie et 11 pièces provenant de résections chirurgicales recueillies par J. Moutier et par moi depuis trois ans, nous avons trouvé 29 fois un ulcus gastrique ou gastro-pylorique sans lésion ulcéreuse ou cicatricielle du duodénum, 3 fois un ulcère du duodénum adjacent à l'anneau pylorique qui était légèrement entamé par la lésion ulcéreuse, et une fois seulement un ulcus de 12 millimètres de diamètre situé en plein duodénum, à un centimètre et demi de la falaise pylorique. Depuis cette époque, sur

Syphilis
Artério-sclérose, etc.
(Ioduro-Enzymes)
Todure sans Todisme

Todurase

de COUTURIEUX.

57, Ave. d'Antin, Paris,
en capsules dosées à 50 ctg. d'iodure
et 10 ctg. de Levurine.
