

Fam. XIV des POMPILIDES, XIII, p. 33.

Gen. POMPILUS, Fabr. p. 34.

Retranchez les espèces : 5 *Philadelphicus*, Cr. et 10 *maurus*, Cress.

L'espèce 13 *castaneus*, Prov. que nous avons crue nouvelle, est l'*argenteus*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. Phil. I p. 93.

La clef qui suit permettra de distinguer plus sûrement les espèces.

Abdomen noir ou bleuâtre, sans taches ;

Bord postérieur du prothorax arqué, non anguleux ;

Ailes noires ou brun foncé ;

Métathorax tronqué postérieurement.... 1. *æthiops*.

Métathorax arrondi postérieurement ;

3e cellule cubitale en triangle pé-

diculé..... 11. *tenebrosus*.

3e cubitale quadrangulaire.... 9. *angustatus*.

Ailes hyalines ou subhyalines :

3e cubitale en triangle pédiculé.. 12. *cylindricus*.

3e cubitale quadrangulaire ;

Face à pubescence argentée.... 13. *argenteus*.

Face noire..... 6. *hyacinthinus*.

Bord postérieur du prothorax anguleux ;

Prothorax à forte pubescence grisâtre..... 4. *griseus*.

Prothorax sans pubescence grisâtre ;

Face à pubescence argentée ;

3e cubitale très rétrécie supérieurement,

presque triangulaire..... 7. *Virginlensis*.

3e cubitale peu rétrécie supérieurement. 3. *luctuosus*.

Face sans pubescence argentée ;

Métathorax avec un sillon au milieu... 8. *apicatus*.

Métathorax sans sillon sur son disque. 2. *scelestus*.

Abdomen avec 2 taches blanches..... 14. *biguttatus*.

Abdomen taché de roux à la base..... 15. *marginatus*.

Gen. CEROPALES, Latr. XIII, p. 45.

A l'espèce décrite, ajoutez les 2 suivantes :

2. Céropale pieds-longs. *Ceropales longipes*, Smith, Brit. Mus. Cat. III, p. 179.

♀—Long. .40 pœ. Noire ; tête plus large que le thorax ; yeux