

on donne le nom de *bord postérieur* à la ligne qui s'étend de l'angle externe C, à l'angle interne D, c'est-à-dire qui forme le sommet de l'aile.

On donne généralement le nom de disque à la surface même de l'aile. Les nervures qui partant de la base même de l'aile s'avancent jusque vers le milieu ou au-delà de sa longueur, conservent le simple nom de *nervures* 1, 2, 3, 4, 5; tandis qu'on désigne par celui de *nervules*, celles qui ne tirent pas leur origine directement de la base, mais qui naissent des précédentes et qui s'en distinguent toujours par leur moindre grosseur 6, *b*. Les nervures et les nervules sont dites *longitudinales*, quand elles se dirigent de la base vers le sommet; et *transversales*, quand elles forment avec les précédentes un angle plus ou moins ouvert. On les nomme aussi *récurrentes*, lorsqu'elles semblent n'être qu'une continuation d'une nervure longitudinale, qui changeant de direction, se recourbe sur elle-même.

Les nervures longitudinales sont le plus souvent au nombre de cinq, quoiqu'il ne manque pas de cas où elles se trouvent réduites à 4, à 3, ou même à 2 seulement. Lorsqu'elles sont au complet, celle qui est la plus voisine du bord antérieur, ou plutôt qui forme elle-même ce bord, prend le nom de *nervure costale* 1 *a* fig. 35, (c'est le *radius* de Jurine), elle aboutit un peu au delà du milieu de l'aile, dans une espèce d'empâtement plus ou moins opaque qu'on appelle le *carpe* *a*. Celle qui la suit est la *sous-costale* 2 *b*, (le *cubitus* de Jurine), longeant ordinairement la 1<sup>ère</sup> en s'en rapprochant plus ou moins, elle va comme elle se perdre dans le carpe, *a*. Naissant de la base de cette dernière, ou du moins très rapprochée d'elle, s'en trouve une 3<sup>e</sup>, qui se dirige d'abord en ligne directe, puis va joindre le bord extérieur, pour se perdre dans la dernière moitié de l'aile, en décrivant divers zigzags, c'est la *médiane*, 3 *7*.

Au dessous de cette dernière, mais à quelque distance à sa base, se trouve la *sous-médiane*, qui va aboutir d'ordinaire vers le milieu du bord interne, en faisant une courbe, 4 *8*.

Enfin, entre cette dernière et le bord interne se trouve la 5<sup>e</sup>, qui est ordinairement plus grêle que les autres, c'est l'*anale*; elle se soude à la sous-médiane vers son extrémité D.

(*A continuer*).

### Un Entomologiste d'état.

Les journaux des Etats-Unis, nous apprennent que le Dr. W. LeBaron, de Geneva, vient d'être appointé entomologiste d'état pour l'Illinois, en remplacement de Mr. Walsh, décédé.