

LES ICHNEUMONIDES DE QUEBEC

(Continué de la page 53).

6.—Écusson blanc ; abdomen noir et jaune, l'extrémité noire ou roussâtre, mais non tachée de blanc ou de jaune.

36. Ichneumon comes, Cress. (Ichneumon compagnon.)

Ichneumon comes, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. I p. 301, ♂.

37 Ichneumon lætus, Brullé. (Ichneumon gai).

Ichneumon lætus, Brullé. Hym. IV, p.

Trois spécimens ♀. Varie ; segments 2, 3 et 4 seulement avec bandes jaunes, souvent la bande jaune des segments 2 et 3 est plus ou moins rousse en approchant de la bande noire ; métathorax quelquefois avec taches jaunes.

38. Ichneumon flavizonatus, Cress (Ichneumon zoné de jaune).

Ichneumon flavizonatus, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 156, ♂.

Quatre spécimens ♀ ; la barre jaune à l'extrémité du 2e segment abdominal est d'un jaune orange.

39. Ichneumon nobilis, Cress. (Ichneumon noble).

Ichneumon nobilis, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. III, p. 155, ♀.

Quatre spécimens ♀, dans tous la barre jaune à l'extrémité du 2e segment abdominal est plus ou moins orange, tandis que celle des 1er et 3e segments est simplement jaune.

40. Ichneumon mimicus, Cress. (Ichneumon mimi-que).

Ichneumon mimicus, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. I, p. 300, ♀.

Dix-huit spécimens ♀ ; très variable dans sa coloration ; le métathorax étant parfois tout noir et d'autrefois taché de jaune ; le 1er segment est aussi quelquefois taché de jaune à l'extrémité, de même que le 4e ; le post-écusson est tantôt noir et tantôt jaune. Assez semblable au *lætus*, Brullé, mais de plus petite taille.