

FORMULAIRE.

Hémoptisie.—*Bartholow.*

P.—Extrait fluide d'ipéac	5 gouttes
Teinture de digitale.....	10 "
Extrait fluide d'ergot.....	1 drachme

M.—A prendre en une seule dose, toutes les heures ou toutes les demi-heures jusqu'à nausée et vomissement.—*Northwestern Lancet.*

Coliques néphrétiques.

P.—Borate d'ammoniaque.....	2 drachmes
Eau distillée.....	4 onces
Sirop simple.....	$\frac{1}{2}$ once

M.—Dose : Une cuillerée à soupe, dans beaucoup d'eau, toutes les deux heures.—*Journal de médecine de Paris.*

Spermatorrhée.—*Sinety.*

P.—Extrait de belladone.....	} aa 4 grains q.s. p. 10 pil.
Poudre de racine de belladone.....	
Conserve de roses.....	

Dose : De 1 à 3 pilules, le soir, au coucher, dans les cas de spermatorrhée nocturne résultant du spasme des vésicules séminales.—*Union médicale.*

Hypertrophie de la luette.—*Dr Monin.*

P.—Muriate de morphine.....	4 grains
Bromure de potassium.....	1 drachme
Teinture de coca.....	2 drachmes
Glycérine.....	$1\frac{1}{2}$ once

M.—Usage local.—*Union médicale.*

Rhumatisme articulaire.—*Hôpital Bellevue.*

P.—Hydrate de chloral.....	1 drachme
Acide salicylique.....	$1\frac{1}{2}$ "
Onguent de stramonium (U. S. P.).....	1 once

M.—Usage local.—*Analectic.*

Diphthérie.—*Dr C. H. Hughes.*

P.—Hydrate de chloral.....	1 drachme
Sirop de tolu	1 once
Eau de menthe q.s. pour faire deux onces.	

M.—Dose : Deux cuillerées à thé dans deux cuillerées à soupe d'eau en gargarisme—quatre fois par jour.—En outre, à l'intérieur, une cuillerée à thé, le soir, au coucher, et répéter après minuit ou vers le matin si l'enfant est alors réveillé.—*St. Louis Med. and Surg. Journal.*