

Insectes de bonne taille, le plus souvent complètement noirs, à ailes plus ou moins enfumées et violacées, fort agiles et assez difficiles à capturer.

15 espèces rencontrées, dont 3 nouvelles.

- Abdomen noir, ou noir-bleuâtre, sans aucune tache ;  
 3<sup>e</sup> cellule cubitale non en triangle ni pédiculée ;  
 Chaperon brièvement échancré à son bord  
     antérieur..... 1. *æthiops*
- Chaperon arrondi ou largement échancré en avant ;  
 Nervure séparant les cubitales 2 et 3 verticale ;  
 Prothorax nu ou à peu près ;  
     Chaperon marginé en avant..... 2. *scelestus*.  
     Chaperon non marginé en avant..... 3. *luctuosus*.  
 Prothorax couvert d'une forte pubescence  
     grisâtre..... 4. *griseus*, *n. sp.*
- Nervure séparant les cubitales 2 et 3 plus ou moins  
     inclinée ;  
 2<sup>e</sup> cubitale en carré oblique ;  
     Bord postérieur du prothorax fortement  
     arqué..... 5. *Philadelphicus*.  
     Bord postérieur du prothorax presque  
     droit..... 6. *hyacinthinus*.  
     Bord postérieur du prothorax anguleux. 7. *Virginienis*.  
 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> cubitales fortement rétrécies sur la  
     radiale ;  
     Bord postérieur du prothorax anguleux. 8. *apicatus*, *n. sp.*  
     Bord postérieur du prothorax simplement  
     arqué..... 9. *angustatus*.  
 3<sup>e</sup> cellule cubitale en triangle sessile ou pédiculé ;  
     3<sup>e</sup> cubitale en triangle sessile..... 10. *maurus*.  
     3<sup>e</sup> cubitale en triangle pédiculé ;  
     Face sans pubescence argentée..... 11. *tenebrosus*.  
     Face à pubescence argentée..... 12. *cylindricus*.
- Abdomen noirâtre avec bandes soyeuses-blan-  
     châtres..... 13. *castaneus*, *n. sp.*
- Abdomen noir avec bandes ou taches jaunes..... 14. *biguttatus*.  
 Abdomen noir avec une large bande rousse..... 15. *marginatus*.

1. **Pompile nègre.** *Pompilus æthiops*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. v, p. 451.

♀—Long. .76 poe. Noir foncé avec poils noirs, l'abdomen plus